

# ORYCTOGRAPHIÆ PEDEMONTANÆ SPECIMEN,

EXHIBENS CORPORA FOSSILIA  
TERRÆ ADVENTITIA:

*Auctore CAROLO ALLIENIO, Ph. &  
Med. Doct. & Societatis Physico-Mat-  
hem. Florentinæ, & Academiæ Regiæ  
Medicæ.*



PARISIIS,  
AD RIPAM AUGUSTINORUM,  
Apud Claudium-Josephum-Deperdum PAVONI, Bibli-  
opulæ, et vulgus Societatis Comitiæ de Sancti Iosephi  
in dicta.

---

M. DCC. LVII.

*Cum privilegio de approbatione.*





## PRÆFATIO.

**P**ER unquam Philofophi Na-  
turalis hiftoria partem illam  
penitus negligendam fufcep-  
erunt, quæ faciem & com-  
pofitionem telluris noſtræ confiderat,  
quæ maximè appropriatur, ut na-  
turaliam terræ amorem Foffilium,  
principaliè marinorum, quæ antiquiſque  
regionis conſtitutione, hiftoriam exhibeat.  
Nihilominus enim generatione  
quædam circa telluris chæmiæ prin-  
cipia deficere non poſſit, niſi variæ  
telluris noſtræ ſpeciei probe diſtingueren-  
tur. Id autem per ampliffimas terra-  
rum viſtas omnino ignoratur, nec ab  
iis, qui regionum pluriſum Foffilia  
inconfiderant, ad ſemper diligentiâ  
perſeclendi erit eſt, ut malis non ſuper-  
ſit deſideranda. Earum ſcilicet ac-  
quiſitiſſima voca ut per totarum terrarum

iv P R Æ F A T I O.

ratione capterem, parva Fossilia in-  
 quere capere, & in cellaris nostris sta-  
 tum amandarent. Horum vero in-  
 gruentem copiam, generum varietate  
 speculabilem, colligere contigit, quo  
 fallam est, ut amplius michi fides in  
 stalla fuerit, majoresque, quàm spe-  
 rare licebat, stallas perciperem. Non  
 idcirco appropinquo autem & program  
 me fallaciam expellam, si breviter hoc  
 epistulae mihis nostris statum, quod  
 ad corpus maris fossilia stellas,  
 exhiberem. Neque alienum est, in-  
 tegrum in ea Fossilium, quæ nostris in  
 collibus obvia sunt, historiam con-  
 scribere. In raris enim curam abesse,  
 & collum amplitudine, acris operosa  
 res est, & nimium ardui laboris. Po-  
 tissimum itaque saltem recensenda cur-  
 re, eaque, quorum nomina nomina apud  
 Auctores disticta reper. Unam in-  
 rem Naturæ Philosophiæ amato-  
 bus studium hoc meum gratum accep-  
 tumque est quæ: non enim amplif-  
 ficam mercedem laborum meorum ac-  
 cepisse mihi visetur, novisque in dies  
 suscipere alicuius animo concedam.

FLÉNUQS AUCTORUM  
QUI STANT.

*Acta Helveticæ Botica, Vol. L. 1758. Fol.  
H. 1758. 24 pp.*

*Albizzioides* (Urb. ex) Malmeo *modicorum*,  
Roxburgh, 1834, in: Fed.

Argenville, (M.D.) L'Histoire Naturelle Reli-  
gieuse dans deux de ses parties principales, la  
Lithologie et la Conchologie. A Paris,  
1741. in-4. fig. L'Oryctologie ou Histoire  
Naturelle. A Paris, 1751. in-4. fig.

**Poldaroli** Offerta salumi sopra il Sale della Croce, con un fazzoletto di prosciutti naturali dello Smau Smau. In Salumi, 12.110. 10-12.

**Keywords:** *McGrath, Karkhanavav, Brown, 1996.*

Bergvall (Philippe) *Différentielle physique de Poisson*.  
Schönbach-Göteborg, 1974. 88 s.

Conservatori de Documente Documente de  
Materie Informatica. Roma

*Epheborhynchus* novae Cyprioferae Cretariae,  
Gefora (Schauinsland) Deltaria de purifica-  
tione differentia de variis origin. Tigris,  
1712 m.a.

Giovanni (Paul.) *Indes Cappellotti* *Indes*.  
London, 1792. 4to.

Gualtieri (Nicola) Index Tabacorum universalis. Florentiae, 1742. in-Fol.

Hill, History of Fossils by John Hill. London, 1748. in-Fol.

Jacobi à Malles, de lapidibus figuratis apud antiquos Libanenses Commentaria epistolica. Lubeca, 1732. in-4<sup>to</sup>.

Klein (Theod.) naturalis dispositio Schizothorum. Göttingae, 1744. in-4<sup>to</sup>.

Linnaei Systema naturae. Edidit Carolus Sueciae. Stockholm, 1746. in-8<sup>vo</sup>.

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

Meyeri (Michaelis) Menchura Vaticana. Roma, 1719. in-Fol.

Moser (Joseph) Dissertatio de monumento clauiano. Bononiae, 1719. in-4<sup>to</sup>.

Planci Arminius de Concha mineis novis libris. Fenniae, 1739. in-4<sup>to</sup>.

Rondeletii universae Aquilinae Nilius per alios. Lugduni, 1757. in-Fol.

Rumphii (Everhardi) Thesaurus cenchiorum, Soc. Amstelredam, 1703. in-Fol.

Scheuchzeri (Joh. Jacobi) Musaeum clauianum. Tiguri, 1716. in-12.

Targioni Tozzetti, Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, per

effluens le production naturali, e gli an-  
tichi monumenti de l'Isle. Firenze, 1731,  
1734. Tom. II. in-8°. sup.

Traité des Pétifications. *à Paris*, 1741. in-40.

Valleyus (Jean) Gersbach, Minéralogie, ou  
description générale des Minéraux de royaume  
suédois, tirée de l'Allemand.  
*à Paris*, 1753. Tom. II. in-8°.

Zanischelli, Apparatus mineralis Mafei Zan-  
ischellii. Poenae subitana, in. habent  
Aprile 1710. in-4°.



---

*APPROBATIO.*

**I**nvenimus Gallie Cassellæ jussu operi  
laudatè perlegi, cui titulus est: *Orytho-*  
*graphia Palæontologia germanæ, &c. Auctore*  
*Carolo Albinio, &c.* Illudque dignum joculari,  
quod typis mandaretur. Datum Parisiæ die  
primæ mensis Decembris, anni 1796.

LAVIROTTE,  
Censur. regius.





# ORYCTOGRAPHIÆ

## PEDEMONTANÆ

### *SPECIMEN,*

#### EXISTENTIS CORPORA FOSSILIA

#### TIPIE ADVENTITIA.



PEDEMONTANA pars regio  
est, montibus & collibus  
però antiquè cincta: ad  
separationem enim, oc-  
cidentem & montem Al-  
pum amplissima cava est, quæ ab  
Helveticis producta, in Mon-Regalen-  
sis & Genovesæ Alpes terminatur.  
Inter montem & orientem, in Vic-  
turiæ Augusta-Taurinorum, colles as-  
cendit, qui deinde in magnum In-  
subrinum sese extendentes, in Mon-Reg-  
alenses, Savonenses, Genovesæ &

Demonenses atque montes continent, & comprehendant Transversam provinciam partem, Alba-Pempeis, Montis-Regalis, Alexandria & Demonia provincias, Montem-Ferratum & Comitum Alensem.

Alpium nostrarum compositionem ingrediuntur Schisti, Quartzæ, Spathi, Talci, Mica, Amianthi, lapide calcarii, & mineralium, & Mercurium & Stannum cupias, omnis generis particula. Colles vero constituuntur ex arenis, sabulis, terra, argillis, cretis, margis, gressis, lutulentis, sulphureis, silicibus, & siccis calcariis & argillis, quarum penè omnia per horizontalia, sat oblique inclinata sunt posantur. Hec collium implisima siccitas (1) est, in qua corpora maxime fossilia adinventantur, & quævis in cujusvisque minerali siccitas inventa sit, certum est in terris sabulosis ea frequentius occurrere, & cæterarum Alensium provinciarum demonstrant esse. Vallis d'Andora dicta,

(1) Quia loci inter Alpes expositi sunt scopulis hinc fossilia, hoc est, propter locum & siccitatem, inter Alpes Transversas.

### *Pedemontana.*

quam parca ab urbe Adarum milliari-  
bus distat, ex meris conchalis, terris-  
que sabulosis condita fuisse videtur.

Celeberrimi viri Johannis Walleri  
(1) vestigia insitens, hæc corpora,  
quæ D. Hill (2) vagis terra-adrenariis,  
divido in petrificata vegetabilia, petri-  
ficata animalia, & petrificata reliqua.

## PETROLITUS.

Foliorum nostratium stuporemque  
impressiones, ut alni, quercus, fagi,  
&c. aliquando observantur in stratis  
inchariti topi. Similium enim herbo-  
rum estypos habeo in monti indurati  
ex valle loci de Favre. Nullibi fre-  
quentius adveniuntur foliorum im-  
pressiones, quàm in collibus proximi  
opidi de Adara. Sicut ibi integra  
sunt foliorum per ochram quandam  
petrificatorum; sed cum arte esse eui-  
dam sive sine ordine omnino sarrice  
cerantem & conglutinem, difficile  
integra videri possunt.

(1) *Mém. de l'Acad. des Sciences, Tom. II.*

(2) *History of Fossils by John Hill. London,  
1740. p. 110.*

## LITHOTRUM.

Ligni fossilis & lapidescenti exemplaria in locis saepe educuntur, quibus conchilia; eademque sunt varietates commixtae. In vicinis Vicis Aglianensis, in provincia Astensis, observari integrum insignis arboris truncum densi argillae septum; hunc truncum recentis praesens labentis exedunt aquae ferides decurrentes. Id vero in eo trunco procul memoratu dignum adnotari, partes in siccum lithotracem, pitum et durum filicem scintillas levi ictu percutiens manifestum esse, & partim adhuc calidum facile ralem ligni substantiam. Truncum universum bituminis succus penetravit. Hoc trunco separatum specimen in Museo nostro, quod hoc res facies una ostendit. Demonstrat colles ligni frustra habere non posse, quorum quidam durissimi sunt, ad levem percussione scintillas excutientes, alii bitumine penetrata sunt, & veluti in lithotracem mutati; alii pyriti naturam adepti sunt, atque expoliti.

*Pedemontana.* §

viridulum produnt. Ligni dentium Den-  
tunctis serrati frusta habeo, quæ  
inter ipsa sulphuris strata reperta sunt.  
In valle loci Col de Ferret, frusta  
& muci arboris variè lapidescenti ex-  
sunt.

Longè quàm alio ullo loco copio-  
sius Lichenyli colligi possint in colli-  
bus oppidi in *Alvra*. Ibi cunctis Fos-  
silia hujus generis adinventumur,  
quæ detrahit rerum naturalium scrutator  
cunctus Domatus Richerius; co-  
rumque nonnulla humanissime ab in-  
ventore ad me missa, pulcherrimum  
Musæo meo præbent ornamentum.  
Ligna fossilis hujus loci multiplicis  
naturæ sunt; nonnulla merè fossilia;  
alia in verum lithostracem commu-  
ta, & ex his aliquot in terram car-  
bonariam resolvuntur; alia vermicosa.  
In silicem durum conversa plura sunt,  
sticcæ stæces in aliquibus chrysalli-  
fæ. Frusta dentium ligni prædictorum  
ex hoc loco ab eodem amico obtinui  
in gypsi stratis adinventis, quæ chry-  
salis gypsi rhomboidalibus rectis sunt.  
Caricæ, cæteræque plura, quæ in in  
collibus adsunt, profeculo merentur,

6 *Oryzographia*  
ut velis eas, quas super ea fecit inven-  
tor observationes, publici juris facere.

## C A R T O L I T H U S.

Fractum variis juglandis oculus qui-  
dam certissimum humanissimè largitus  
est mihi amicissimus Richerus. Simi-  
les fractus, atque, aliquando in me-  
moratis collibus *della Morte* adve-  
niantur. Observata dignum est, con-  
cedam, seu testem officium fractis variis  
juglandis consumptam fuisse, integro  
modo superest fracta.

. Petrificata animalia, & petrificata  
animalia quod videtur, quoniam multa  
genera comprehendunt, petrificatio-  
que nostrorum Fossilium partem con-  
stituunt, in varia genera esse distin-  
guenda. Hæc constituens, insuper  
præclari viri Johannis Geßneri cedi-  
tem eamque exhibuit in dedicationi  
sua de petrificatione dissertatione. Annamque  
verbis hinc omnia genera animalium,  
aut illorum eorumque fossilis neces-  
saria, mihi necesse est notasse  
generatim percurrere, quod ad fructa

### *Pedemontana.*

7

conferenda, retractorum operamentum faciens, eorum ordinem, positionem & distributionem.

Diximus colles nostros efformari à fluvio, aut horizontilibus, aut per-  
sister inclinata rerum diversarum,  
cuiusque esse arenas, sabula, terra, ar-  
gillas, cretas, gypsum, lithastracum,  
silices & sars, cum calculis, tum are-  
natis, & in quibusvisque harum re-  
rum stratis occurrunt extranea cor-  
pora. Frequentissime in sabulosis ter-  
ris reperitur; minus frequenter in  
cretis & argillis; & adhuc rarius in  
reliquis enumeratis substantiis.

Conchise larani Mercari observa-  
tur in ipso schamrois, & ex his  
eductis exemplaria habeo, quae creta  
sunt in collibus *Tauriacensis* & vici  
*de Molare*.

Gypsi fodinae, quae in Monto-Fornis  
sunt in collibus loci *Alley*, suppedi-  
tunt conchilia plura gypso penetrata.  
Quae bivalvia sunt, substantiam ha-  
bent conchilia gypso intus firmam:  
turbata vero ex parte gypso percusa  
sunt; sed continent modulum, quod  
purissimam, transparentem, & in lamel-





Achate plena conchalis arimadver-  
rit jundatum in agro Bononiensi  
Josephus Montius, & de his plenam  
differentionem exhibuit. (1) Etenim  
etiam, in Senensi agro, pergit (2)  
conchalis, quorum nucleis ex durissi-  
mo, levi & splendore schae sunt.  
Dertoniensis aethra conchali cum Bo-  
nontensibus, quae in Museo meo pos-  
sunt: ex humaritate assictissimi viri  
Ferdinandi Botli; nihil à Bonontien-  
sibus differant: atque in postremis  
spits habent nitidam solum schaeam;  
in praeis amplioribus cretam caru-  
lous, cujus exteriora potissimam co-  
rea sileas est.

In marmorei substantiam commu-  
ta conchalis continet marmar di  
Gassio dictum; lapidis calcarii sub-  
stantiam exhibentis habent marmara  
colles rici *Moravio*, aliisque; cum  
arcti in lapidem congruentem colles  
quidam *Angula-Taurinorum*, di *Mon-  
tes scis Padum, Arripsoni, Moravia*,  
aliorumque locorum. Colla quidem

(1) *Conchae. Bonon. T. II. p. 10. p. 110.*

(2) *Botlium offit. pag. 1. de 17.*

Taurinensis pedes cochilia arenario lapide plena: sed eorum substantia insolentem iniquitatem crystallis concavata est; & in collibus quibusdam vici Segusii cochiliorum nuclei reperiuntur, quorum cortex arenaria concretus est, interiori facie solentius iniquitatis crystallis concavata.

Quae in argillis sese offiunt cochiliae, saepe novissimi nucleos pra se ferunt; in arenis, grana majoribus lapidifictis; in conis & arenosis montibus, optima servata apparent; & in locis novellis, ut neque nativi coloris vestigia desiderantur. *Pedunculus*, *Balanus*, *Concha*, *Podax*, *Ostrea*, &c. saepe adhuc colores exhibentes asbes ex valle d'Andona, & Derronensis collibus. Quid plura? Oidreus mihi fuit in valle d'Andona collectus, in quibus praeter cochiliam residuum colorem, distincte videtur aliquis superflus animalis portio, in intus non cochilia facie sua compressa, & in lapidem commissa.

Nativo colore insignis cochilia regularis; nunc telarum alioquin coloris indatarum invisum adhaec

exemplum referendum. In colle quodam vici Scitœ, loco di Faguer nuncupato, collegi conchilis plura maiorem generum, quæ conchileum colore per se ferebant.

Hæc colorem non omnia æquè imbuta erant; & ex colore varietatem multam contribuiffe. Minora quædam ex integro citrula sunt; majora verò prætereaque alacri solam facie citrulo colore depicta: ex hac idcirco observatione in hanc incidi opinionem, stratum colorantis materiam, contrariam hæc conchilla, ita sese habuisse, ut in eo minora ex toto, majora verò ex parte solam immagerentur. Sed hæc, quæ parvi momenti sunt, contemplanda, & in causam hujus coloris est inquirendum. Hæc mihi colligenti accidit, ut dentem animalis eo loco reperirem, qui ex citrulo flavesceret, magnamque duritiam acquiritur. Soluit statim animum dubitatio, hæc fecisse à succo quodam Tarcosiani fuisse colorem; & exasperat confusam destillatam, quem de Tarcosii Galli-

ei (1) scripti Cl. Remondinus differentiam, & in ei reperi apprimè exhibitam dentem finalem omnino illi, qui à nobis in memorato loco fuit collectus. Cum dentis illius unicum exemplar esset, volumus experiri, nam igne, ut Turcosi Gallici, muretur, quod cerò experimentum infineatur, statim ac aliud hujusce naturæ specimen nascibilis dentem erit. In cochleis ex parte caruleis variis ignis gradibus exploravimus, nam color diffundi posset, quemadmodum in Turcosi Gallici, sed incoctis erant hanc in rem cunctis omnis, & diligentiæ nostra: color nihil inquam sese extendit. Longo igne aliquantulum infirmatur, die tamen ignis vim sustinet oblique ulli destructioni notæ. Dentium obtusaque structura sunt potius coloris dispersionem jactant, cum cellulis rasilque communicationibus ea componantur, non eisdem ratione cochleis, quod organicum corpus est, non per compressionem, ut aiunt Physici, sed per substantiæ calcariæ appositionem tantum.

(1) Mém. de l'Acad. an. 1777.

Quod modum ad ordinem, positionem, & distributionem horum Fossilium pertinet, sequentia adnotari-  
mus. Lithothetraxis in fluvio conchium  
lunatum aliquando offenditur, in argil-  
lis & cretis resiliensibus, subtilem co-  
nachque concha, & echinorum im-  
pressiones obvias videntur. Accurati  
lapides armoria substantia conchas  
cochleasque habent. Sabulosa terra  
minuta & tenera conchilis ut pluri-  
mum condunt, quod tamen perpe-  
tuum non est. Sic vallis d'Andona  
officitur maximos prebet, quorum  
nucleus est sabulosa terra, insana  
paulo maiorum generum, majores,  
minores & minuta conchilis compre-  
hensens. Alacubi videtur offitum paulo  
solum, alibi balanus, alibi conchium  
cassum, ponderosum, hysium, &c.  
Gadit. alibi vero multa multorum  
generum inter se confusa. Plurimum ex  
conchilis nostris fossilibus respondent  
navigis proximi maris mediterranei,  
sed inter ea non pauci occurrunt, qui  
ignoti, aut que tunc novum & remo-  
tissima maribus habeant. Denique  
obstruunt, seu conchiliorum generum.

seu colugis conservatio, seu continen-  
tia istius considerentur, cum Bono-  
mercibus & Eruditis nostris plurimum  
conveniat.

## CORALLIA.

Pars è suis Corallia nostris collibus  
commenat. Madreporus, vulgò *Fun-  
gitarum* nomine notus, *Derrisaphis*  
ager suppediat, & aliquot etiam col-  
legi, cum in valle d'Andosa, tum  
in collibus loci dicti Scisip, in pro-  
vincia Taurinensi. Madreporus vulgare  
insigne exemplar detinet in vicinis  
Augustæ-Taurinorum Domibus Bon-  
zari, Regi laborumque metallurgici  
Director, & Custos Regi metallur-  
gici Musæi, qui congruè Musæi sup-  
pellectilem omni studio augere nititur.  
Mirum sane in tantis conchilionum,  
quibus repleti sunt nostri colles, uber-  
tate, tum tunc corallia fossilia advene-  
runt.

1. Madreporus simplex, ramosa, ramis  
terrestribus fixata. *Gesf. Dyl.* p. 17.
2. Madreporus simplex, ramosa, ramis  
terrestribus levibus. *Gesf. Dyl.* p. 17.

Utrique hæc Madrepora effoditur  
prope Taurinam, & posita etiam  
prope locum Sciolpe.

3. Madrepora composita ex cylindris  
per diaphragmata coarctis. *Linæ.*  
*Aten. ysa. fig. 71. n. 1. & Gesta*  
*stolon.*
4. Madrepora composita lacinias  
coarctatis, aggregata bellis concu-  
latis. *Gesta. Diss. 116. An Africæ*  
*us Pedemontana Jacobi à Melle,*  
*p. 12.*
5. Millepora, poris concentricis,  
majoribusque crenatis, remota.  
*Linæ. Aten. p. 59. fig. 218.*
6. Millepora, poris crenatis subro-  
tunda, diaphragmatibus transver-  
sibus plurimis. *Linæ. Aten. p.*  
*102. fig. 221.*
7. Madrepora composita ex cylindris  
per diaphragmata coarctis, bellis  
angularibus.

Hæc numeris 3, 4, 5, 6, 7, re-  
cessitas Madreporæ omnes præbet  
collis quidam di Sciolpe.

8. Madrepora simplex, turbata, la-  
vis, bellis concavis. *Linæ. Aten.*  
*p. 87. fig. 116.*

Ex Scutpe, vico di Mondavi,  
Derna, & Agosti-Taurinorum.

9. Madrepora simplex, coram compressum referens, corophyllorum foliolum novissimum nota. Ex Derna.

10. Madrepora simplex, turbidum, firus & tubercula alpera, stellâ conciri.

Ex vico di Mondavi & Derna.

11. Madrepora hemisphaerica, stellâ pluri, radiis tuberculata firus. Ex Derna.

In medio convexa faciei hujus Madreporæ possit tuberculum, & quo radiis discodant duodecim series tuberculorum. Stella componitur ex lamellis à centro subcircumferentiam productis. Duodecim majores & exteriore sua tuberculorum respondent; & quatuor, cum sex quinque minores lamellas interceptant.

12. Madrepora Androsacta capitulum referens, exis per poros reticulata.

Hoc Madreporæ nomen tribuo corpusculis quibusdam in colle jam laudato Taurinensi multum obvis, quibus facies convexa est, poris vel



cellulis minimis, usque commun-  
candibus usque crebris; concava  
vel sulcos tenuissimos à centro ad  
peripheriam radicos extuber. Cen-  
cularis, & aliquoties dentata est  
ambitus hujus fossilis; cujus dimen-  
sor à uno usque ad tres Parisenses,  
crebrasque vix semellem longas aquat.  
Suntque ad hanc madreporam cele-  
brede *Porolla minima* *Wassingtoni-*  
*nensis*, *sublana*, *favi ad instar*  
*apertae perforatae* *Schroderi*. *Atas.*  
*Edi.* p. 70.

13. Madrepora, quae fungus Nili mi-  
nor Auctorum. Ex *Schoep.*
14. Corallo-fungus foris tuberosi,  
tuberos lapidei. *Wassera Mineral.*  
*ren.* II. p. 46. Ex vazo de *Alondra*.
15. Madrepora corallina diversis tubu-  
rosis. Ex locis *Chieravalle*, *vallis*  
*d' Andora*, *Belvedere de Arignone*.

## ECHINITE.

1. Echinus, seu posita *ectypus* echi-  
noparag, qui est echinus cordi-for-  
mis similis; perulis vero glacioli-  
bus, sed magis profunde sulcatis



notus, & ad angustiam potius  
clausa, vulgo *Simar*, affideb. *Guach.*  
*Ind. Tab. 299.*

Terra echinam referens est belus  
quidam fluorescentis coloris; colloca-  
tus verb est in vicinis Montis-Re-  
gula ab amico simillimo *George*  
*Bocell*, Medico erudit, Botanico  
& naturalis Historiae amantissimo,  
qui una cum pluribus alia rarioribus  
ejus loci conchalis & echin-  
nam hanc hactenus mihi.

2. Echinus, seu porus echinatus  
ab *Augustino Scilla* exhibet. *Tab.*  
*x. fig. 2.* valde compressus est,  
verb cordatus, cum hilo caudo;  
quatuor inflexus radius, quos affor-  
mant lineae series pandorae, cum  
intermedii aliquando lineae. Radio-  
rum interstitia occupantur à papillis  
apicalibus variae magnitudinis. Non  
adeo imago hujus echinati, adeoque  
positionem sui statuere non licet:  
pau ad summum echini extensio.

Ex vicinis loci *Pino*, aliquot mil-  
liaribus ab *Augusti-Taurinorum*,  
in argilli quidam albi extrahitur.

3. Echinus, qui laquei *Indica* caracibus

*Scilla Mercat. Merit. Var. p. 134.*  
*Echinus planus. Puschsch. Rumpf.*  
*p. 36.* Ex Jussie, colle quodam de  
*Fagnar dicto, & ex vicinis Ma-*  
*galle-Tarmonen cruitur hoc echin-*  
*us, qui non echini scyppus, sed*  
*echinus ipse est cum testis sui fo-*  
*vatus, & sicut Echinus l. Mercat.*  
*descriptus (1): materiam eam ha-*  
*ber, quae emittit inftar lapidis lu-*  
*cidior, & colore pallido est. Noster*  
*in varia fragmenta divisus; nec ejus*  
*integrum exemplar è terrâ educere*  
*lucit.*

4. *Echini Kleinii. Tab. 1. B. C. D.*  
*(1).* In collibus Dermonibus re-  
 periturus testis lapideischi Echini  
 depicti sicuti D. Specimen cum  
 testis sui integerrima edam ex valle  
 d'Andona, è terrâ quidam fabulosa  
 minutissima constata reperiunt.

Echini fossiles, & echinorum  
 scyppus, rari sunt in nostris collibus;  
 & ratio sua patet: echino-  
 rum enim tenera substantia difficilis  
 servari potest; nec materia incrim-

(1) L. C.

(2) *Bot. Del. Echin.*

concurrentem cisternæ formatiois sequens est in locis, ubi conchilia reperiantur.

Echnæorum capillares aciculae adhuc rubentes plures exstrati ab arenâ conchuliferâ vallis d' Andona.

## BALANITES.

Inter rariores fossiles haberi sunt ab Auctoribus balani fossiles. Clarissimus d'Argenville omnium conchiliorum fossilium rarissimum esse balanicum opinatur, & unius fossilis imaginem ex Beyer manentem adducit. Præter quosdam omnium fossilia hæc memorat, & iconem exhibuit Cl. Beyerus, unicam ejus exemplar in agro Norimbergensi se collectam archi hæretico committens. Verumtamen non ita rari balani in præsentem sunt, cum Cl. virorum diligentia & operâ detecta plura loca sint, quæ uberrimè eosdem continent. Nuperitima observantibus docti viri Jacobo d'Annone (1) do-

(1) *Atti Reale Accademia di Scienze di Torino*. *Relazione* Vol. II. 1797. Pl. p. 140. de balani fossilibus agr. Palliand.

testi sunt balani fossiles Basilienses; doctisque dissertatione eisdem non modo diligentissime descriptis, sed uni usque quicquid ad balanorum historiam illustrandam inferre possit. Praeter autem Basiliensem agrum, nunc citum constat, Pisaos & Senenses colles balanus exhibere ex Cl. virorum Targioni Tozzetti (1) & Baldassini (2) observationibus. Bononienses (3) etiam & Veronenses colles Balanus habere, quorum exemplaria in Museo meo posideo, quae debeo generosiori Clariss. amicorum Ferdinandi Bassi, & Johannis-Francisci Segnerii, qui cum singulari benevolentia me prosequantur, fossilium, quae in his collibus collegerant, insignibus collectionibus Musei meo donare.

Verum nullibi copiosius, quàm in collibus nostris balani fossiles reperiuntur, cum mirum defuit ut per om-

(1) *Ann. L. p. 148*

(2) *Osserv. pag. 2.*

(3) In Museo Bononiensi sunt balani nonnulli, praeter palustrales, clausi, clausi, conchoides, balani maris communis, teste Josepho Pignatelli, *Enc. de Montserrat, p. 45.*

nibus locis, quae corpora mariae fossilia continent

Eorum plura species & varietates observare licet, pro magnitudinis & occupati corpora diversitas. In meo Museo ostendere possum balaneas, à viæ visibili magnitudine ad eam angustitudinem, quae duorum pollicum Pariterendum latitudo non metietur, & pluribus diversis cochleis adhaerentibus, ostreis, pectinibus, charitonibus, perparitis, Strombus, aliisque multarum specierum. Frequentissimè insident ostreis & pectinibus. Quod ad conservationem spectat, plures habeo, quae rubellum aut nigrum nativum suum colorem adhuc pra se ferunt. Verùm non hic solum rubello colore insignem balaneam enuncior, fossiliter servatam habent etiam Fissuræ colles, quemadmodum testatur Targione Tomassini (1); & Bononienses à penclarissimo viro & charissimo amico Ferdinando Bassi ad me missas, pulchrè etiam adhuc rubere manifestum.

Balani fossiles pro diversâ aetate plu-

(1) L. C.

similia varium Juniores, et Quatuor  
sepe valva sola remodo componatur;  
caque cum levissima in junioribus  
fiunt, striata in gradioribus evi-  
dant: valvæ etiam sunt magis, tunc  
quies ad invicem accedunt, et hoc  
pacto diversâ ratione coarctantur. Cor-  
poris insuper, cui insunt balanus,  
facies aut plana, aut arcuata, facit, ut  
eorsorum balanus diversam etiam figu-  
ram adificetur. His omnibus causis  
fit, ut balanorum fossilium species dili-  
genter defini possint; potissime Bala-  
norum nostrorum sunt sequentes.

1. Balanus ore angustiore, striatus,  
parvus, laminosus. *D'Argentan. Cho-  
et. p. 314. T. 30. fig. D.*

Lepet utriusque conchæ truncatâ, aper-  
culo obtusa. *Linn. Faun. Suec. n.  
1348.*

Balanus Balthicus. *Vide Auctores,  
L. C.*

2. Balanus his foveis, ex cinereo &  
obscuro variegatâ.
3. Balanus leviter, cinereis, aut albican-  
tibus, vasis longè tenuioris.
4. Balanus major, Tulipe vel Tin-

cinnabali-formis. *Rumphii Thes. Zool. III. A.*

5. Balanus ore ampliore, major, latus. *D'Aleazar. Couch. p. 354. T. 30. fig. A.*

6. Lepas with conical tubercle, operculo scutiform. *Less. Faun. Sans. 8. 1349.*

Balani n<sup>o</sup>. 1<sup>o</sup>. omnium uberrime reperiantur: iidem locis balani n<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. & inter utroque iidem locis aliquando balani n<sup>o</sup>. 4<sup>o</sup>. qui copiosius quam ullo alio loco in eisdem loci *Argentei* reperiantur. Balanos n<sup>o</sup>. 3<sup>o</sup>. aliquot collegi in valle d' *Andona*, & nonnullos etiam habuerat *Charavalle*. Balanos qui recensentur numeris 1 & 2, nemo, quod sciam, adhuc reperit fideles, invenit tantummodo fidei species 1 & 2. Postremi rari alii in regionibus occurrunt. Hujus speciei exemplum me habuit in suo Museo *Johannes-Jacobus Schenckerus* (1). In agro Bononiensi duo reperti esse hujus balani speciei, mihi significavit

(1) *Fab. Mus. Del. p. 30. n. 309. 310. 311. d. Thaurin. 1. 5.*



antiquissimas Bassas : eorum unus ornatur Musæum celeb. Josephi Mazar., aliter vero Musæum parvum Johannis Placci Arminensis. Verumensis balneum, ut me per litteras certiores fecit Johanne-Franciscus Seguardus, qui totalem Historiam agri Verapensis animè feruens est, plurimæque purissimæ, & Bononiensis ac Palatii multo minores.

Cæteræ itaque regiones, quod ad balneum spectat, nunciat Pedemontanæ, cum in eo præter Balneum alijs insidiæ, Balnei majores Auctorum frequenter occurrant. Balneum enim, ut supra adverti, plurimum, quorum diametrum ad basin aquæ pollicem duos Farsingos. Unum omnium maximum inter cæteros affervo, cujus altitudo perpendicularis est duorum pollicum cum lineâ. Valvæque crassitie in hoc est ultra lineam.

In finili Balapio, cætero cunctis denudato, bene pulcherrimè inspicitur valvarum structura. Balneum ex foveæ valvis componitur : in junctionibus quatuor circummodò aliquando sunt, quarum quatuor præ-

caput sunt, duæ minores sunt veluti  
accessoriae. Singula hæc valva formatur  
ex lamellis juxta & positis, quæ  
lamellæ minorum aliam fasciculatam  
sunt. Fasciculæ & lamellæ magis magisque  
semper accedunt ad invicem,  
& conjunguntur; ut quò magis ad  
valvæ saniem appropinquant, eorum vi-  
sibilis numerus minuitur. In illo  
specimine, in quo hæc observavi, du-  
centis lamellis numeravi. Rationem  
structuræ & compositionis uberius  
non persequor, cum diligentissime  
examina fecerit à præclaro Domino de  
Angene.

### PHOLADITES

Inter corpora marina fossilia ut rarb  
occurrit Pholadina, ut præclar. viri  
aperte asseruerint, neminem Con-  
chologum nondum præfate fossile. Do-  
minus d'Angerville inquit (1): Non  
occurrit fossilia nisi ultimam fa-  
miliam, scilicet *Polinychium*, *Con-*  
*charum Anatifram*, & *Pholadum*.

(1) *Conch.* p. 217.

Eandem firmandam prorsus Vallerius (1), neque de horum opinione recedit Johanneſ Geſnerus (2).

Pademoniam interſperantibus Hiſtorie amicis Pholades foſſiles exhibet; eorundeſque plures ſpecimina in Muſeo meo aſſervo. Non properea tanta mihi invenienti Pholadarum gloria debetur, ſed prædixit viro Joſepho Moſano, Botanicæ & naturalis Hiſtorie in Bononiæſi Academiâ Profeſſor celeberrimo. Primum de Pholades foſſiles collegit in agro Bononiæſi, & literariæ Republice anno 1746 in Commentariis inſtruitiſſimam Bononiæ communicavit (3) doctiſſi Diſſertatione, quâ plures hæc ſæpe re obſervationes continenter. Inter plura verò, quæ adnotavit, illud nunc licet commemorare. Pholades illos foſſiles cum nullis adhuc cognitis convenire; eſſe novæſque plene coſchiliſſi generis, in aliis tunc ſolentem coſchiliſſi in montibus ſolentem, quorum ſimilis maris noſtam coſtant.

(1) Muſæi. Tom. II. p. 116.

(2) P. 116.

(3) Tom. II. p. 116.

Quod rursus Josepho Moysis in for-  
rem Pholadem examine conigit, ut  
nullam alioque notitiam ex hæc scilicet  
colligant, idem & nunc scripsit, qui  
libet diligenter inquirerem, reperi  
cum nulla ætæ specie, neque eam  
cum Bononiensibus, nec ipsa Pholades  
facile conuenire.

Pholadem, ut omnes sciant, ex na-  
tura est ipse credens, ut aut in suo,  
aut in cochleariorum testis inhabitant,  
facile est id re. Nostri ex illis sunt,  
qui cæterorum cochleariorum testis in-  
habitarent, neque alibi reperi sunt,  
quæ in crassa cochlearis, uti ex Gg.  
in cochlearis nostris descriptis numeris  
1, 2, 3. in Olivo insigni fossili, Bon.  
Carmis, quæ ab hoc cochleario asse-  
runtur, forma cochlearia respondent,  
oblongo-ovales est, aperturæ amplissi-  
ma, etiam ovali, parva cum cochlearia  
per suam longitudinem posita, & pe-  
tente. Summa Pholadis longitudo est  
quæ linearum Parisiensium, latitudo  
minima, aut minime cum dimidia. Tota  
transversa est, & fere transversa,  
quæ ex albo-fulgentiori, superius co-  
lore, videtur aurorum testis fuisse.

Hocem Pholidum foramina in ossibus Ostræis, aliisque crustis conchilibus, sepius deprehenduntur; rari tamen inveniuntur superflui in his Pholidum conchilium.

Sola vallis d'Andons ex nris suppediavit conchilia, quæ Pholades fossiles exhibent, dâc de cæteris pluribus alijs locis foraminibus peritis conchiliis adinventantur.

Pholidum postrocorum memorati foraminis non infrequenter superflui inveniunt in Ostræis insigni fossili: hoc verò foraminis jampridem notum fuit in finibus Ostræarum à Cl. Montio, qui etiam tunc temporis suspicatus est, Pholidum opus illa foramina esse. Invenio nunc temporis Pholade nostro, liquet, non solum pro se quædam habere, à Pholadibus ea efformari, verum etiam suspicari, corpora illa pyriformia in his foraminibus inventa, quæ ab aliquibus pro Margaritarum concretionibus observabantur Cl. Montio, nihil aliud esse, nisi Pholades nostræ induratum margem conchiosæ. Rursum Pholidum nostrorum color ex albo splendet; eorumque

*Cl. M.*

externa facies hanc quibuscumque aspectum, veluti essent strata superincumbentia, agnoscitur: quâ ratione extimam corporum pyriformium faciem scire habere, Cl. Morsus animadvertit.

## P A T E L L I T A.

1. Patella vertice mucoso, basi irregulari, inaequaliter sinuata, sulcata, & veluti lamellis composita, ex albedo cinerea, in ejus cavitate canaliculæ bicornis perpendiculariter adnascitur, candidas & fragiles, cujus usus mihi ignotus est. *Guald. Tab. p. Ex oppido Lucida.*
2. Patella vertice perforato, oblonga, sinuata, noviculis albis lineis in gyrum gradatim dispositis circumdata, basi sinuata demum, subulata. *Guald. Tab. p. N.*  
 Ex loco la Provata de valle d'Andona. Ex arenâ conchaliâ, quâ oppletur ostrum maximum ad eundem elegantem salernum, aliquando sequenti hanc patellam, omnino præter colorem integerrimam.
3. Lepas, nulla Sinensis. *L. Argus,*

*Palmarum.*

34

3. Concha Tab. B. J. Ex valle d'Andana, Jacifé, Alencão.
  4. Parva limbo integro, stris radiatis, strio latere productione, limbo obliquo in dorso circumdata. Gual. Tab. B. F.
- Ex Agafid-Taurinorum.

CONCHILITÆ.

1. Concha crassa, ponderosa, hirsuta, & sericeo villosa indumento fuligineo colore vestita. Gual. Tab. 13. A.
- Unique ferè adhaerentur; cumque super conchali exemplari eductas ex valle d'Andana & Agafid-Taurinorum vicinis.
2. Concha valvis aequalibus, inequalibus, notabiliter umbonata, & rectiuscurva, subrotunda, vulgaris, stris radiatissimis ligata, ex albedo & carneo fuscata. Gual. Tab. 84. B.

Ex Chaurville, valle d'Andana, & ex Jacifé.

3. Concha valvis aequalibus, inequalibus, notabiliter umbonata, &

31 *Orythopecten*

rectâ incurvata, subrotunda, vulgari, crassa, sabulosa, fons & apice nigri novae Guat. Tab. Fa. C.

*Idem*; cum primo adhuc coloris indicem.

4. *Buccellium costiforme*, triangulare. *D'Argens. Conch. Tab. pl. D.*

Ex valle d'Arles & ex Charnalle, cum nigro etiam sereno colore.

5. *Concha Bonari. Mus. Cl. 11. n. 90.*

*Idem.*

6. *Concha marina*, valvis aequalibus acutiusculis umbonatis, & oblique incurvatis, subrotunda, vulgari, fons circulantibus, profunda, albis, bullis exasperata & circumdata, crassa, sabulosa. *Guat. Tab. 75. N.*

Nalibi docet; sed abunde reperitur in collibus locorum *Arigvans, Senay & Montella.*

7. *Concha marina*, valvis aequalibus, aequaliter, mediocriter vel leviter umbonatis, & oblique incurvatis, subrotunda, fons profunda, transversa, umbonem versus decrescen-



viridis, elegantissime undique cincta,  
albida. *Gualt. Ind. Tab. 76. F.*

Ex valle d'Andona & Mon-  
reale.

8. *Concha inaequaliter, laevi, subal-  
bida, crassa. Gualt. Tab. 87. B.*

Ex valle d'Andona.

9. *Concha imbricata, latero latere  
magis producto, undicibus depre-  
ssis, acuta & frequentibus scalpe-  
rata, & striata, subultra. Gualt.  
Ind. Tab. 87. C.*

Eodem ex loco.

10. *Concha valvis aequibus, in-  
aequaliter, scabelline mureata, &  
rectè incurvata, subrotunda, vul-  
gata, gestulam striata, ex albida  
& fuscis fasciis colata. Gualt.  
Tab. 88. C.*

Ex Chiavari, cum superfluo  
eius natro colore.

11. *Concha inaequaliter, stris minu-  
tissimis circumdata, subalbida, li-  
neis laevibus serpentibus, & angulis  
acutis efformantibus, diversimodè  
signata. Gualt. Tab. 86. F.*

Ex valle d'Andona & Chiavari.

11. *Concha lutea*, vulgò *Piscione*.  
*Plinco*, de *Conch.* p. 31.  
*Ex valle d'Adona.*

### PECTINATIS & PECTUNCULUS.

1. *Pecten tenuis*, stris crassis, latis, rotunda & raris distinctas, totus candidus. *Guad. Tab. 34.*  
*Ex Arignaco.*
2. *Pecten tenuis*, stris, stris imbricatis & marginis ex roseo & albedo variegatus. *Guad. Tab. 34. H.*  
*Ibidem*, & *ex valle d'Adona.*
3. *Pectunculus stris*, alero latera leviter gemulato, ex flavo albicans. *Guad. Tab. 34. F.*  
*Ex Arignaco.*
4. *Pecten tenuis* admodum complanatus sive compressus, fragilis, pallidus, stris, stris in dorso vultu lineis à cardine ad circumferentiam diffusis, internis verbò stris rarioribus aquè distinctibus, in plano aequali aequaliter emicantibus. *Guad. Tab. 33. B.*  
*Ex valle d'Adona copiosissime.*  
 Frequenter reperitur vultu pla-

*Pedunculus.* 35

nū, convexi, cum fragilis sit,  
destructi. Inter linea mollis Costa  
& Tophi levis major occurrit.

4. *Pedunculus*, stris imbricatis &  
maricatis, ex rufo & sabulida  
variegatus. *Gualt. Ind. 34. M.*

Ex locis *Baie*, *Arignone*, *vallē*  
*d'Andane* & *Cassianura*.

5. *Pecten* leviss, leviss, stris imbricatis  
& maricatis, ex albo & albedo  
variegatus. *Gualt. Ind. Tab.*  
*34. H.*

Ex *Arignone*.

7. *Concha* *pedunculata* major, in parte  
plana stris concentricis asperis, in  
parte vob convexa stris striatis in-  
signiter notis, concentricis lineis  
falsis, ex albo rufescentia. *Gualt.*  
*Tab. 38. A.*

Ex *Arignone* & *vallē d'Andane*,  
ex quo loco in *Museum* *hist.*  
*specimen*, ejus latitudo pollicis  
*Pandora* *octo*, longitudo septem a-  
qui. In hoc deprehendere cūm licet  
primitivum caeserem colorem.

8. *Pedunculus* stris leviss, maricatis  
caeseris, croceus. *Gualt.*  
*Tab. 34. B.*

Ex valle d'Andona.

9. Pecten tenuis minor, striis rotundis & crassis, ex fusco purpureo, perdisca cinctus & pictis aliquando alpestris. *Gualt. Tab. 73. G.*

Ex *Anguil-Taurinorum*, *Arri-*  
*gnano* & *valle d'Andona*.

10. Pecten tenuis, striis striatis signatus, ex albis, & rubro colore nebularum. *Gualt. Tab. 73. F.*

Ex *Arriagnano* & *valle d'Andona*.

11. Pecten tenuis mediocriter crassus, striatus, striis placentis minutisque incisuris signatus, croceus. *Gualt. Tab. 73. D.*

Ex *Schiave* & *Arriagnano*.

12. Pecten Bonarri. *Cl. n. n. 7.*

Ex *valle d'Andona*.

13. Pectunculus parvus minutissimè striatus, ruber. *Gualt. Tab. 74. A.*

Ex *colle Taurinorum*.

## TERRERULE.

*Terrereule*, que *Concha raris*  
*montis*, *verruca rollata*. *Col. de l'asp.*  
*pag. 26.*

Conchiglie dette del Colonna Anton. Seris, Tab. 14.

In collibus Arignani, locis dictis *Pianet* & *Cel di Cherna*, copiose colligi possunt *Terebracula*. Subulci duri veri plene sunt, & costam habent spinatam firmam, quassatis est, & distracta in lamellas scinditur ex albo splendentes. Locum *Concholia* nunc magis, nunc minus profunde facit. Alibi etiam similes *Terebracula* leguntur, ut in valle d' *Andona*, in collibus di *Monteide*, di *Picco*, di *Montevi*, & in *Dorona* vicina. *Terebracula Doronensis* potius sunt *Egypti*, aut moduli *Terebrularum*, nulli *Concholia* destruit. Aliorum locorum *Terebracula*, sicut *Terebracula Arignani*, integre sunt; ex ramis ex *Cornu* fissis edunt, undique sunt.

## MUSCULITE.

1. *Musculus* rugis univertis inaequalibus signatus, ex fulvo & albo infectus. Gual. Tab. 90. d.

Ex valle d' *Andona*.

38. *Crytlographis*  
 2. *Concha longa*, à Rondetia dicta  
 Bononi. *Myf. Cl. m. n. 38.*  
 Ex Chiavalle.  
 3. *Concha rhomboidalis elongata*,  
 striata, stris insigniter crassis, tum  
 & subrotunda. *Lucif. Tab. 83. Q.*  
 Ex Dione & Chiavalle.  
 4. *Tellina pilosa*, ex mare Mediter-  
 raneo. *D'Argens. Conchif. Tab.*  
*19. M.*  
 Ex valle d'Adona.

#### P I N N I T A.

Dein Pinnitem fossilium species  
 Multam meam exhibet: unam seu  
 Deriventia ager, seu colles de Mon-  
 taldo dederunt; altera copiose sine  
 erui potest non longè à loco Quarto,  
 secus viam quæ ab urbe Adaram ducit  
 Alexandriam: abundè etiam reperitur  
 in valle d'Adona. Pulchrè in ea  
 ut superfluo periculis color; nihilo-  
 tamen minus interea curam curandi  
 destrudi suppetere, non licet asse-  
 mere, quoniam sint similes moris,  
 quibus æque fossiles pinæ respon-  
 dent.

## OSTEITES.

1. Ostrum structurâ peculiari, magis depressam, subrotundam, tuberculosam, perosam, peripheriâ minutissime plicatâ eleganter circumscriptâ, albidam. *Guak. Tab. 104. G.*

*Ex vicinis Taurinorum.*

2. Ostrum vulgare, maximam, usque imbricatum, squamis reflexis, ex alterâ parte planum, ex alterâ convexum.

*Ex Aragonia.*

3. Ostrum imbricatum, squamis non reflexis, vixi una mediâ convexâ, alterâ concavâ.

*Ex Chaurville.*

4. Ostrum, seu Spondilus complanatus, sculis suis longis & canaliculatis insigniter muricatus, umbone suis producto, ex subulâdâ flavo. *Guak. Ind. Tab. 101. A. Fig. 171.*

*Ex valle d'Andana.*

5. Ostrum, seu Spondilus, margine interno dentato. *Guak. Tab. 99. F.*

Eodem ex loco.

6. Ostium structuri peculiaris, lamellatum, echinatum, aculeis rugulosis, caudiculatis, stris longius, crispatis & vacuatis, cinereum, iatis candidum. *Gault. Tab. 103.*

*Ex Argenteo.*

7. Ostium structuri peculiaris, magis depressam, plicatam, lamellatum, tuberculatam, pullo colore nigricans. *Gault. Tab. 104. B.*

*Ex valle d'Andona.*

8. Ostium structuri peculiaris, stratum, lamellatum, tuberculatum, divinismodi seriosum, ex fulco cinereum.

*Sidem.*

9. Ostium vulgare, squamosum, sulcatum, atro-fuscum, vel sericeo colore luridum. *Gault. Tab. 105. A.*

*Ubiq. & sepe cum ortho nativi coloris.*

10. Ostium vulgare stratum, stris rotundis, crassioribus, interruptis radiatum, squamosum, ex fuscis viridiora. *Gault. Tab. 106. B.* Ubi que multiplex rugositas. Specimen in meum Musaeum ex valle

*d'Andona*



*Pelemmura.*

41

*d'Andona* distincta est, cujus una  
valva absque nucleo, neque in la-  
pidem versa, pendens libera nos-  
trata quindecim.

11. Ostreum, seu spondilus oblongus,  
rugosus, aculeis longo, crassis &  
validis munitus, umbone magis  
producto, & veluti pedicula don-  
to, ex subulula eicertus. *Guald.*  
*Tab. 121. B.*

Ex valle *d'Andona*.

12. Ostreum, seu Concha Gryphoi-  
des, globosa, lineis squamosis emul-  
sata. *Guald. Tab. 121. F. C.* Om-  
nibus fere locis, in quibus petrifi-  
catu reperitur, uberius adin-  
venitur.

13. Ostreum vaticum flammis rubris  
insignitum. *D'Argenz. p. 314. Tab.*  
*25. G.*

Ex valle *d'Andona*, cum rubri  
coloris notis superficialibus.

14. Ostreum. *D'Argenz. Conch. Tab.*  
*25. I.*

Ex valle *d'Andona*.

15. Concha subrotunda, una veluti  
perfecta, cujus multiplex sunt  
varietas. *Guald. Tab. 97. B.*

D

*Ex Arignano.*

16. *Carcharias lavis Montui. Mus. Vat. p. 190. F. 3. art.*

*Carcharias lavis Asaphorum.*

*Ex Scythæ, Pectio, vicinis Pæ-  
rinorum, Monte-Bajula Mon-Re-  
galisquam, Derivas, Arignano,  
Mauront, Mouschis, & Mallare  
in Monte-Ferrato.*

*In argilla, creta & lithastracia  
strata sæpe adhaere Grithum, rari-  
ssima.*

*Grithum inter Ostrum reco-  
luntur, cum formâ suâ Ostris  
suis assimilantur. Postremò supersti-  
tendiendum nostrum Ostrum  
quoddam rarissimum, in Bononiensi  
agro solum aliquando observatum.*

17. *Ostrum fossile, interitè ad basin  
elegantè subactum. D. Montii  
Carm. Bon. T. II. p. 46. pag. 348.  
fig. 11.*

*Ostrum fossile, magnitudine &  
figurâ insigne C. L. C. pag. 229.*

*Ostrum rarissimum Polyxapog-  
nymon, ex monte vulgò del Sajo  
Agri Bononiensi. Schuch. Mus. Del.  
pag. 87.*

*Cochlea polygynghyna margaritacea*, ex montibus Bononiensibus, & *Cochlea polygynghyna margaritacea*, ex Monte - Petreto. *Zamisch. Appar. p. 17.*

*Agropyronchium. Albr. Mus. nat. p. 87.*

Inter corpora fossilia Bononiensia agri, quæ docti & eruditi quæserunt vir celeberrimus Josephus Moenius, postremum tantum locum non habet Ostrum hoc, cujus integra hactenus in Commentariis Bononiensibus erat, nisi cum variis aliis observationibus ad telluris thesaurum spectantibus. Aldrovandus quidem, Scheuchzerus & Zamischellius ante Cl. Moenium utique Ostri hujus mentionem fecerunt, sed nihil præter nomen tradentes, ut idcirco ejusdem descriptionem Josephus Moenius diligenter debuit.

Insigne hoc Ostrum, quod Bononiensium monti vulgò *del Sapo* propriam videbatur, cum nullo alio loco adhuc occurreret, nobiscum etiam in colibus detecti anno 1751, cum herbarum & fossilium colligentium curâ

Affertum provinciam peregrinum. Et inire in vallem quandam d'Andona dictam maris hic reliquis recessissimam vocat, & in eâ mihi sese obtulit Oileum hoc, cujus tanta vis est, ut eo plenissima draus ad plures milliaris longè latioque sese extendant.

Percussit flumina aurum Odrei, cui simile apudum videram, copioso fopulu aspectus; novumque planti Conchali genus mihi videbatur. Domum itaque reduci nihil magis erit in votis, quam apud astutis Hesperia Auctoritate quæret & investigare, non aliquis de flumine, aut maris, aut fossili corpore meminisset. Inter reliquos Auctores, quos mihi esse consulendos davi, meum mox sese obtulere Commentum Bononiense, maximeque sui voluptate perfusus, quando incidi in memoratum J. Monti Dissertationem, quæ graphice descriptum nostrum Oileum deegregat hinc. Ut interim nullius dubitationis locus relinqueretur, noviter detodum meum Oileum ad amicum dilectissimum Ferdinandum Hægem misi, ut illud cum Bononiensâ compareret; illâ verò compe-

quodam, curioſum me ſociis, omnino  
idem cum Bononiensibus eſſe; & ut rei  
veritatem ipſemet oculis ſcribere  
poſſem, Oſtrum compluribus humilitate  
largitus eſt.

Non eſt ovum ovo ſimilis; eadem-  
que eſt in uniſque conſervationis ra-  
tio. Cùm itaque Bononiensibus ita fuerit  
accuratè deſcriptum, ut ea ſingula,  
quæ ad huius ſpeciei huiusmodi tradi-  
dam pertinent, conſiderentur, non alia  
habemus addenda, quàm obſervata  
ſiquor, quibus obſervationes Cl.  
Monti confirmantur.

Oſtrum hoc totum compositum ex  
luminis unionum colore ſplendentibus,  
quarum ea confuſio eſt, ut inte-  
riori omnium longiſſime ſit, exte-  
rioribus verb, prout magis externas  
ſunt, contritus deſiciat. Extrema idè  
ſpeciei Conchiliæ ex luminis umbra-  
tum poſſet compositum eſſe videtur. Inde  
ſi, ut extrema Conchiliæ pars intelli-  
ſima ſit; idèque eà parte poſſe ſem-  
per ſtriptum invenitur hoc Oſtrum,  
aut licet integrum invenire, mirum  
vi rumpatur. Caſu huius Oſtri plu-  
ras eſt, & offendit parvulos inſuper

rectos fulcos, cum intermediis profundioribus craticulis. Scheuchzerus de Zannachellius polygonglymmum de polyteptogonglymmum, ex hac carditis structura diantur. Eorum tamen fulcorum is non est usus, perinde ac si sese mutuo-occipientes, utrinque valvem clauderent; sed traducendis ligamentis ad huius valvem contrahendas necessitas verissime interuenit. Hanc quidem observationem non perperam fecit D. Montius, qui etiam meminit, iunctam Ostrei facie caeca adesse foramina. In singulis, quae consideravi, huius Ostrei speciminibus, haec caeca foramina ego etiam observavi. Tria plerumque, aliquando quatuor sunt, & in utriusque valvi insculpta. Eorum finis licet confusus ad cardinem fulcra sit, non tamen in singulis similiter respondet. Huiusmodi lamine non perforantur, sed finis insculpitur, qui in omnibus lamine visibilis est: idcirco puto ea esse contrahenda, non tantum ad animal valvem sunt retrahenda, sed etiam ad laminationem se contrahentem.

Corpori pyriformi I. Josepho Mont-

nia observata maxime deficiunt in Pedemontio; sed de his sermo habebitur, cum de his phaladim agitur.

Quod tandem attinet ad viros medicos hujus Oltrei, observationes plures habeo, quibus mihi conficit, ascoebenam saluberrimam vim longè magis in hoc, quàm in ullo alio exercere; hoc verò argumentum diffusè examinabique in Oltreo Bonaventuræ Josephus Montani pertractavit.

### T U B U L I T A

Inter corpora maris terra infesta, nulla ferè sunt, quæ Tabulis uberius dispersa sint. Ea, quæ Detrodum vocant veniant, nullibi defiderantur: non ita copiose occurrunt reliqui maris Tabuli, licet neque rari sint. Tubulorum omnis generis tanta est copia inter *Ancos* & *Quarzo*, ut ibi ex Tubulis terri quidam arenarii & topheæi luteolentæ conluisse ferè videantur. Multiplex est in Tubulis, profunditas, forma, magnitudo, superficialis & interiorum rarius, eoque vix permina ceteros

*Oryctogaphis*  
differentiarum hunc flammam : cu  
prope, que collegi & adnotari,  
dicimus.

1. Tubulus marinus, regulariter in  
curvus, stratus, strus rari, majus  
culis, sulcatis, viridis, nonnullisque  
fistula vinctibus cinctus. *Guad.*  
*Ind. Tab. 10. E.*

Ex *Arguano*, *Scitpe*, *Alon*  
*belli*, *Castellano*, *Calcar*, *valle*  
*d'Andora*; & ibi ubique frequens.

2. Tubulus marinus regulariter incur  
tus, pedum aut strus incurvus,  
stratus, strus ipsa duplicitibus &  
nonnullis hunc cinctus, ex alio  
subvinctus. *Guad.*, *Ind. Tab. 10.*  
*F. C.*

Ex *Derna*.

3. Tubulus marinus, seu *Derna*,  
subvinctus stratus. *Alon*, *Cher*  
*renat*, *Derna*, *T. II. pan. alb. pag.*  
*407. F. B.*

4. Tubulus marinus regulariter incur  
tus, stratus incurvus, & viridis  
nonnullis hunc cinctus,  
*Derna* dictus, levis, candidus.  
*Guad.*, *Ind. T. 10. C.*

Ex *Scitpe*, *Castellano*, *la Perna*.



3. Tubulus marinus vermicularis, concatenatus, stratus, crassus, albidus. *Gualt. Ind. Tab. 10. N.*

Ex *Annone*, *Incisa*, *Belvedere*, *Monte*, *Marignana* & valle d'*Ardena*.

4. Tubulus marinus vermicularis, concatenatus, stratus, nodis nigris punctatus, lucidus, albidus. *Gualt. Ind. T. 10. Z.*

Ex *Annone*, valle d'*Ardena*, *Chiaravalle*, & *Demarcifibus* collibus.

7. Tubulus marinus irregulariter incertus, vermicularis, leviter stratus, & in turbidem obusorem desinens, subulidus. *Gualt. Ind. Tab. 10. V.*

*Ex loco ex loco.*

8. Tubuli marini irregulariter incerti, vermiculares, in congreum simul usque. *Gualt. Ind. Tab. 10. F.*

Ex *Annone*, valle d'*Ardena*, *Synope* & *Chiaravalle*.

His alios addo, de quibus nulli certi videri apud Auctores licuit; hæc sunt:

9. Tubuli marini cylindrici, solitarii,

novati, strus circularibus levissimis pedicis, minime intorti.

Ex locis *Senolze*, *Pierref*, *Dermaur*, *Châtenaill*, *Arignans*, *Montbail* & *Augy-St-Vaast*.

10. Tubuli cylindrici levissimi, nulli forte intorti, sui solitarii, aut cum adnatis Tubulis n°. 8. recensita.

Ex *Senolze*, *Armon*, *Dermaur*.

11. Tubuli intorti non concamerati, digitalis crassitiei, maxime rugosi & striati, vix intorti.

Ex *Lesy* & *Montaldi*.

## BELEMNITES.

Belemnitarum vestigia observavi in marmore quodam lapide Sailla, prope de Sanduero reperta. Ammonitis plenissimo; sunt verò hi Belemnites cylindrici apice conico, alveolo donati, cui paralleli nullius radii peni perpendiculariter eorum crassities antecellens planam non videntur superare. Non alius, quod sciam, apud nos Belemnites occurrunt; & mirum sunt, in tantis Conchylionum bene servatorum capis, quæ colles nostri sciant,

neque unum Belemnitem reperiri potuisse.

Die disputarunt Philosophi de Belemnitarum origine, donec rationibus pluribus celeberrimi viri, Joh. Flaccus Breyner (1) & Theodorus Klemm (2) comprobarent, ad testaces esse referenda: quorum opinionem etiam amplius est celebratissimus Linnaeus (3). Nemo tamen hanc naturam nostram Belemnitem vidit, uti conari observare Targione Tomassini (4). Refert natus, si in Museo Canadici Vincentii Capperi observasse corpus quoddam maris, eadem maris Corallorum rubrorum infans, omnino Belemnitarum figurâ. Longitudo hujus corporis era paulo ultra dimidium pollicem Parisiensem; diametri ad ejus os duo lineae circiter aequabat. Structura interna multis thalumi comprehende-

(1) De Belemnite Profecto Commentumcula. Bull. de Polytechnique française, p. 27.

(2) Lapides squarrosos Belemnites, ab eo etiam J. B. Schucherus vocantur, polymorpha testis & quidam à Theod. Klemm Götting. 1792.

(3) Systema Naturae.

(4) Bull. L. p. 276.

ter, à substance ipsiusmet Conchili efformatis. Testa hujus Conchili crassa, et tenuissima & transparenta.

Credendum est, Tabulum hunc Polyhalatum, qui Belimari adpignem deesse, Pelagurum Conchilium esse, quod in mariis & montibus recte inveniri non possit propter ejus delicatissimam substantiam, & corporum residentium & super incumbentium pondus.

### AMMONITES.

Cornu Ammonis plura comprehendit lapis quidam Sallus, qui reperitur prope à Sambucus inter Alpes Vindobas, sed ad radice altissimi montis. In simili lapide Sallio, prope vicum S. Stephani, loco dicto der Rube, reperiantur etiam frustula Ammonis cornua. In locis majora & minora diversarum specierum specimina observare licet simul commixta : sequentia dextra.

1. Cornu Ammonis spinatum, spinâ bonis inter sulcos emittitur, frons

simplicibus testis ad marginem circumferentibus, ibique paulo incrassatis, & ad apicem lapidis reflectis. *Schuchz. Mus. Dier. p. 30.*

2. Cornu Ammonis leve, triam vel quatuor spinarum, quæ in eodem sunt plana. *Schuchz. Mus. Dier. p. 30.*

3. Cornu Ammonis non spinatum, densè striatum, stris simplicibus dorsum trajicientibus.

4. Cornu Ammonis spinatum, quatuor vel quinque spinarum, stris testis in margine circumferentibus. Pales implenduntur habent, quatuor utrinque et octo circumvolutionum, stris dupli transversi mensuræ inter se distantibus.

Hæc Ammonis cornua potius sunt nitrorum Conchylionum ætymi, cum reverè Conchilia testis in se superici non implentur. Quæ verò densè circumstantibus Ammonis cornua fossilis, ipsorum fossilis Conchilia sunt: ea tamen non in lapide substanti, sed in arenâ quidam Aferri advenimus, neque sunt illi usque nunc, quoniam in arenâ, quod sciam, reperta sunt.

Ammonis cornua, quorum testa integra esse.

Sedulo qui de his minimis Ammonis cornua primum animadvertit in arenâ cupida mens prope Hildesheimiam (1) Elias Camerarius, deinceps eandem parcel. Boettius in arenâ Bononiensi docuit, & de eis diffusè scripturæq; dedit (2) in Compertis Bononiensibus. Hi perclarissimi viri atque ostenderant, minima hæc Ammonis cornua vera Conchilia esse, à mari in montibus demissa, sed nondum comperta habebant easce temporis analogi magna testacea, quorum inventio debetur perspicacissimo Naturæ scrutatori Jaso Planci Arminensi, qui varia Ammonis cornua monstravit in arenâ litore maris Arminensis (3), & ostendit eadem esse easq; is, quæ in montibus reperiuntur. Observavit enim Plancus, cornua Ammonis fossilia vixit Bononiens-

(1) *Phil. Eph. Nat. Cur. Com. I. & II. Obs. clxxxv. de Com. vi. Obs. xxxvii.*

(2) *Tom. I. p. 19.*

(3) *De Conchis instructa. d. pag. 8. et pag. 17.*

Et omnino illi respondere, quod ipse vocat *Cornu Ammonis* hinc *Arminacris* vulgerrimum, & cuius specimina etiam addat, Cl. Auctor observavit, in montibus circa Arminam, & in terrâ ardens montis Cognani.

In hac ardensi terrâ montis Cognani addunt etiam alia specimina aliter cornu Ammonis, quod Juno Flanco dicitur (1) *Cornu Ammonis* hinc *Arminacris* minus vulgare, orbiculatum, striatum, umbilico prominens, ex quo stria & orbiculatus comae profertur; & à Gualtero (2) deinde vocatus fuit *Nautibus* minimar, quâd amississimâ marginaur, umbilico utriusque prominens, à centro ad circumferentiam striatur, stris paucis, coarctis, minutissimis granulatur, & suffoculobido celare splendat.

Idem etiam cornu Ammonis visum est in arenâ Seculâ à Johanne Cellero (3); & in arenâ Pisani, loco S. Giovanni della Fina dicto, à Juno

(1) L. C. p. m. T. 2. E. m.

(2) Ist. Vol. p. m. T. 12. d.

(3) Del. p. 12.

Flasco, *Arca* duntaxat nomen *di* *Parafcio* & *Cafiana*, juxta prædilecti *Targioni* (1) *Tornati* observationes, præter fingula *Ammonis* cornua à *João* *Flasco* descripta, alia enim adhuc ignota continet; quibus observationibus ostenditur, arca prædictæ conclusitæ *Septis* minime *Ammonis* cornua continere.

In nostris autem arca *Affendi* reperitur utrumque cornu *Ammonis*, nempe *hæc* *Ammonis* *vulcanisum*, & *cornu* *Ammonis* *hæc* *Armenisum* minus vulgare, orbiculatum, striatum, umbilico præminente, ex quo *stria* & *loculamenta* arca prædicta. Hujus tanta est copia, ut in arca una ultra mille continetur; & arce adveniunt pleraque exemplaria seu bene conservata esse, ut distinctè observari possint, cum *stria* seu intersectiones, cum interjacentia granula à *Flasco* depicta, & à *Gualtero* commemorata. Multo minori quantitate reperitur vulcanisum *Armenisum*, quod sæpe etiam distinctum est.

(1) *Tar. I p. 171* & *Tar. III p. 174.*



Artem hanc Anthonifera collecta ē  
 me huc in monte quodam posita ad  
 finem vallis d'Aschoux. Vallis hanc  
 quicquid maris collibus uberrime  
 referta, ibi monticolae dicunt ar-  
 nasse terras, in quā poter majora  
 Conchilia, miram etiam continentur  
 multiplicem generis; & hinc, quam  
 nunc descripti, arnassam terram ad-  
 iuvant.

Terrae arnassae conchilliferae hu-  
 jusce loci ad examina referens, ut con-  
 tentis in his corpora dignoscerem, eas  
 diligenti curā sum prosecutus, spe  
 ductas rependendorum Oniscorum, a-  
 ram. Inveniendi spes maximam su-  
 ccessu detestis gloriā Conchilio-  
 rum, quae cum Oniscorum in An-  
 thonifera sedimento occurrunt: verū  
 nulla usque nunc sedulo licet inqu-  
 renti obvia fuerunt; non tamen in-  
 vices eorundem colligendorum spes  
 omnia abjicitur.

#### N A U T I L I T E R.

Unum Nautilem reperi in vicinia  
 Angula-Turiacum, qui non Nauti-  
 E

est modicus, verum Nautus ipse  
fossilis est; cujus amplores concinne-  
rationes à turci fabulosi, minores  
à schismatici chrysalidaniore replentur.  
Eo loco illum collegi, qui apud nos  
celeberrimissimus est, à confectis montis  
Capaciocorum, in alaci vallis parit.  
Respondet Nautus noster Nautiti  
descripto figurâ 251 in libro, cui ti-  
tulus est : *Tratado das Pedras de  
A. Paris, 1741.*

Huacitas, vel Numularias lapis.

Nili inter Numularios lapides re-  
censentur cuncta quædam Ammono-  
ni cotius in arca àlicubi à me de-  
secta, Numularios lapides Pedunculati  
nam nonnulli edebant. Congerit  
quantum peritocorum in collibus  
Dionysioribus reperire detecta sunt,  
que parva numularios lapides con-  
tinere videntur, sed tamen inter Num-  
ularios lapides locum mereri non-  
dum alicui.

Cochlearis, Trochlearis & Nauticae.

1. Cochlea Bossardi, *Mus. Cl. 3.*  
A. 15.

Ex *de Provana & Schöpe.*

2. Cochlea longa, pyriformis, intor-  
ta, integra, linea elegantissima, vo-  
luti quodam minutissimo opere so-  
rico reticulata, aliquando candidis-  
sima, aliquando subulsa, & nonnul-  
lis raris maculis masculinis sabab-  
scuræ notata. *Guald. Tab. 26. L. 16.*

Ex *Schöpe, Passione, la Pro-  
vata.*

3. Cochlea marina, umbilicata, cino-  
rea, punctis obscuris raris aspersa,  
fasciis interruptis, ejusdem, sed  
magis intensi coloris, circumdata,  
*Guald. Tab. 67. Q. R.*

Ex *valle d'Adonia*, punctu ru-  
bra distinctè notata.

4. Cochlea marina, umbilicata, hy-  
vis, vel subulsa, vel ex albedo &  
masculino colore lucide nebulari,  
aut depicta. *Guald. A. B.*

*Idem.*

5. Cochlea marina, pura, strigata,  
E 11

*Stria nodosa & leviter muricata aspera, ex rubro & rubro fuscis variegata & maculata, insula argentea.*  
*Gualt. Ind. Tab. 68. D.*

*Indem. Argenteo unicolorum colore utitur pulcherrimè splendet.*

6. *Cochles Castiliformis, umbilicata, minutissimè & densissimè striata, alba, fuscis & quadratis maculis fuscatis & reticulatis circumdata.*  
*Gualt. Tab. 39. G.*

*Ex valle d'Andana, Monsalio, Torrona & pluribus locis.*

7. *Cochles maris, unretiformis, striata, umbilicata, viridis, nonnullis maculis piceis seriatim elegantissimè depictis, insula argentea.*  
*Gualt. Tab. 64. C.*

*Ex valle d'Andana.*

Hæ sunt *Cochles*, quæ poni introoffere aut plures alias, quæ habeo; in reliquarum superflue facio ea non habens prius imaginis argumenta, quæ de respondentis naturæ naturalis specie decernerent.



B U C C I N I T E A.

1. Buccinum, quod fasces brevis.  
*Rumph. Hist. Tab. XIII. G.*  
Ex *Decona*.
2. Buccinum variis Babylonica. *D'Argem. Choch. p. 264 T. II. M.*  
Ex *Decona*.
3. Strombus cancellatus, rostratus,  
ore simplici, squatus, in firmamento  
cujusque spem papillosus, canaliculo  
curvatus longissimus, subalbidus.  
*Gualtheri, Ind. Tab. 36.*  
Ex *la Piovra*.
4. Buccinum sinuatum reticulatum.  
*Planci p. 27.*  
Ex locis *Mabileto, la Piovra,*  
*Cheruvale, Scuran, Decona,*  
*Arignano.*
5. Strombus integer, ore similitudo,  
latus, ex candido subcaesio colore  
conspicuis; sed in circumstantibus  
aliquid ex livido afflicta. *Gualtheri Ind. Tab. 36. F.*  
Ex *Sciope & la Piovra.*
6. Buccinum majus, cancellatum,  
rostratum, ore simplici, rugosum.  
E u

62 *Orythographia*

ex albo & fusco variegatum, punctatum, & undatum depictum, intus ex atro fusco intectum, ore curvato. *Gualt. Tab. 46. F.*

Ex valle d'Andona, *Derona*, & *Picena*, *Athenis*.

7. *Baccatum* majus, carnulorum, ciliatum, ore labiato, crassum, dens & punctum, seu ciliis emittentibus rugosum, elongatam carnulatum & crispum, candidum, aliquando ex fusco ligatum. *Gualt. Tab. 48. C.*

Ex *Clavaria* & valle d'Andona.

8. *Baccatum* majus, carnulorum, ciliatum, ore labiato, crassum, umbilicatum, labio carinato, dentato, flexuoso, ciliatum, rugosum, ciliis colore & albedo intectum. *Gualt. Tab. 48. D.*

Ex valle d'Andona & *Athenis*.

9. *Baccatum* majus, carnulorum & sulcatum, striatum, ciliis minutissime mucronis asperum & densum, vitta fulvida colore depictum. *Gualt. Tab. 51. G.*

Ex valle d'Andona, *Lucina*, *Tigridis* & *Picena*.

10. Baccinum majus, canaliculatum, & sulcatum, striatum, costulae aequaliter devalum, minutissime mucronum, ex albedo salivaram. Guaiac. Tab. 52. I.

Ex valle d'Andona & Chieravalle.

11. Stercoribus canaliculatus, rostratus, ore anguloso, in summis canaliculi striatus, deinde rugis oblongis rubrofus, albidus. Guaiac. Tab. 52. G.

Ex valle d'Andona.

12. Baccinum majus, canaliculatum, rostratum, ore lobato, striatum, canaliculo & rostro fuscis punctis, triangulare, striatum, papillosum, rugosum, colore fusco depictum. Guaiac. Tab. 52. B.

Ex Chieravalle, cum nativo adhaerente loco, & Derona.

13. Stercoribus canaliculatus, rostratus, ore anguloso, striatus, rugosus, rugis concentricis, albidus. Guaiac. Tab. 52. Q.

Ex valle d'Andona.

14. Stercoribus canaliculatus, rostratus, ore anguloso, striatus, rugosus.

lun, papilloſus, ore tamen interno  
ſtriato, maculatus. *Gualtherus, Tab.*  
*52. F.*

*Idem.*

15. *Buccinum majus, conſpicuum,*  
reſtinuum, ore ſimplici, ſtriatum,  
rugatum, maculis papillis coro-  
nato, duabus lineis parietalis ſcissis  
emarginatis, labio externo den-  
tato, intus profunde ſtriatum, ex  
extro ſulco & albedo infectum. *Gual-*  
*ther. loc. Tab. 46. B.*

Ex loco in Molare eductur hoc  
*Buccinum* plane petroſactum, &  
ex parte in ſiliſtium ſubſtantiam  
verſum.

16. *Turbo pyriformis cyſtus. D. Mo-*  
*ni, Icones. Tom. II. p. 21. p. 195.*

Unique ſex adherentur.

17. *Buccinum* Inorn. *Antiquaria,*  
obum nactum amaleon. *Planci,*  
*pag. 24.*

Ex valle d' Andona, ſed petrarâ.

18. *Buccinum elegantiſſimè ſtriatum,*  
ore rotundo. *D. Moſſi in Icones.*  
*Tom. II. p. 21. p. 195.*

Ex *Deliana.*



## STROMBITEA.

1. *Strombus integer*, vulgaris, mucrone gradatim producto, papilloso, seu mucronato, ex albedo subflavus. *Gast. Tab. 54. M.*

Ex *Demonas* & *Sciope*.

2. *Turbo apertus*, canaliculatus, coccineus, striatus, striis papilloso, in primâ & secundâ spirâ aculeos obtusos mucronatos, colore melleo nigricans. *Gast. Ind. Tab. 56. H.*

Ex *la Piovana*, *Sciope*, *Argentino*, *Demonas*, *Lucello*, *Tigiale*, &c.

3. *Strombus canaliculatus*, acuminatus, mucrone gradatim producto, papillis oblongis distincto, luteo subflavus. *Gast. Tab. 52. H.*

Ex *Marquane*, *Lucello*, *Cyphæro*, *Tigiale*, *Charavalle*, *Argentino*, *Sciope*.

4. *Strombus luteus*, vulgaris, luteus, coccineus, macula crocea formationis bipolam circumdata, & luteo notus. *Gast. 53. G.*

Ex *Lucello*, *Charavalle*, *Der-*

rossa & fasciata. Specimina ex colle quodam d. Chiaravalle etiam maculas croceas adhas exhibens, ut etiam Dromedaria.

1. Turbo lincei, vulgaris, maximus, densissime striatus, spiris triginta crester elongatis, fuscus. Guss. Tab. 33. A.

Ubique copiosissime, sed rarissime in mari.

2. Turbo apertus, fuscus in margine, spirarum papillæ rugosæ apiculatibus ciliatis. Guss. Tab. 37. L.

Ex Chiaravalle, Dromedaria & valle d'Andona.

3. Turbo apertus, lavis, candidus, macula rufa deorsum depictus, viginti spiris finis. Guss. T. 50. B. Fig. maj. & min.

Vallis d'Andona & Scialty majora, minora vero suppelant Ciceratiis.

4. Turbo apertus, fuscus, transversim per longitudinem striatus, aliquando costellatus, livido & plumbeo colore obductus, in spirarum commissuras fuscis cingulis, aliquando

dò parvis punctis rufa seriatim dispositis circumdatis. *Goath. Tab. 17. D.*

*Ex Charavalle & Scialpe.*

9. Turbo apertus, cancellatus, oblique incurvatus, fissus, minutissima papilla utroqueque emporatus. *Goath. Tab. 17. C.*

*Ex Charavalle.*

10. Turbo integer, vulgaris, spiris gradatim completis, fissa minutissima circumdatus, ex albo & roseo eleganter variegatus. *Goath. Tab. 18. C.*

*Ex Arignano, Montello, Scialpe, Castellazzo & valle d' Aoste.*

11. Turbo apertus, latus, levis, albidus, in squarum communium maculis & lineis parvis signatus. *Goath. Tab. 18. C.*

*Ex Scialpe.*

12. Turbo integer vulgaris, minutissime striatus, costis acutis eminentibus, heliophoreis anfr., per medium anfractuum circumdatus, ex fuscis subalbidus. *Goath. Tab. 18. B.*

*Ex Montello, Scialpe, Arignano & Castellazzo.*

13. Turbo lavis dictus. D. Mord,  
Circum. Bon. Terr. II. pag. 195.  
Fig. 4.

Ex valle d'Andona, Scioly,  
Avonay & Maraspans.

14. Turbo virgatus albo-viridis, costis  
talis tenuibus, litoris Animal.  
Planci, de Conch. p. 28.

Ex valle d'Andona eduxi duo  
dilectos hujus turbis exemplaria.

15. Turbo incipit fimbriae, striatus,  
fimbria velut fusciculis in equis dis-  
tinctis dispositis, & super uniuscu-  
jusque valvulae plerumque emittit  
& emittitibus. Guald. Tab. 58. H.

Ex Arignans.

Turbinarum plerumque alius possideo  
species, structurae pulcherrimae opti-  
mèque servate, quarum icones non  
reperi apud Auctores, qui maris Con-  
chilia descripserunt. Arenae conchili-  
ferae valles d'Andona aliquot mareas  
& eas hujus generis Conchilia ex-  
hibet, sicut & colles de Scioly, La-  
cello, Monale, Derrone, Maraspa-  
ns, &c.

## MURICITES &amp; ALATITES.

1. Muricites, seu Muræ muricosa  
*Rondelini, de Test. lib. II. p. 36.*

Ex *Maraspara* & *Dirona*, & *Mellare* & *Antico Monte-Passaro*,  
 Cyprio intus penetrata sunt exem-  
 plaria, quæ postremo loco colligun-  
 tur; intermedietatem suam pervasis  
 ex loco *de Mellare* habentur. Quæ  
 ex montibus *Dironensibus* & *de*  
*Maraspara* habentur, optimè sunt  
 servata sunt. Pulcherrimum habeo  
 exemplar ex *Maraspara*, quod pon-  
 deris libram unam tam gravitas;  
 neque in lapidem versum est.

2. *Succinea cancellulosa*, rostrata,  
 ore labiato, striata, papillosa,  
 aurata, aut admodum crassa, & in  
 quinque appendices aliformes lan-  
 gas & acutas, si extremam turbis  
 munimenta, expansi, ex albedo  
 subflava. *Guald. Ind. Test. 53. B. C.*

Ubique frequens, sed frequentius  
 abrupit alia incocta specimina pre-  
 bent colles *de Maraspara* & *Cava-*  
*rante*.

3. *Serombus caudiculatus*, rostratus, oculolabio, sinuatus, papillosus, antrus, vix admodum crassus, & in quinque appendices breviores expansus, et candido cinctus. *Guat. Tab. 29. A.*

*Ex Tigbale & la Piovra.*

4. *Harpax nobilis*. *D'Argem. Canch. Tab. 20. B.*

*Ex Augusti-Taurinorum.*

5. *Serombus integer*, ore labioso, sinuatus veluti fuscus claus & rotunda transversus sinuatus, macro-ne papillae distincto & signato, candidus, maculis parvis rubiginosis var. pallis variegatus. *Guat. Ind. Tab. 34. A.*

*Ex valle d'Andana, Devona & Charatella.*

6. *Buccinum majas caudiculatum*, rostratum, oculolabio, sinuatum, labio externo dentato, sinu, columin & plicarum eminentibus, crassum, ex albo fuscum. *Guat. Tab. 49. G.*

*Ex Monella.*

PURPURITÆ.

1. *Purpura curvirostra*, striata, papil-  
losa, rugosa, canaliculo incurvo in  
longum late producta, tota crocea.  
Gast. *Ind. Tab. 37. F.*

Ex *Montido & valle d'An-  
dana*.

2. *Purpura rectirostra*, macronata,  
firma & muricata, sculis scutis  
rectis, acuminatis incurvis, ca-  
naliculo longissimo similiter mu-  
ricato, subalbida. Gast. *Ind. Tab.  
36. A.*

Ex *Lucello & la Piovana*.

3. *Purpura rectirostra*, umbonata,  
firma, sculis rectis & scutis acumi-  
natis, albida. Gast. *Tab. 36. F.*

Ex *Stieler, valle d'Andana, Lu-  
cello, Tigheto, Montido, Derra-  
na* variisque locis.

4. *Purpura ventricola*, Ron. *Cl. III.  
n. 10.*

Ex *Chiaravalle, Derrona & valle  
d'Andana*.

5. *Purpura rectirostra* major, sculos  
longos & incurvis semina, albida,

24. *Orylographis*  
aliquando rubescens. *Guald. Ind.*  
*Tab. 30. D.*

Ex rufic d' Audouin, *Monside*,  
*Belvalire*, *Lucist*.

6. *Purpura haustellum*, longiore rostro,  
cuniculo donata, spiris demada-  
tum. *D. Anger. Conch. p. 496. Tab.*  
*39. B.*

Ex *Chaurville*.

7. *Purpura rubicula*, macronata,  
tuberosa, cuniculo fere elongato,  
colore pullo & subulato depicta.  
*Guald. Tab. 30. C.*

Ex *Chaurville*.

8. *Purpura*, seu *Cochlea cuniculata*,  
cuneum incurvum, vulgura den-  
sissime striata, costis plicatis & tu-  
berosa exasperata, obscure sericea,  
fasciis purpureis leviter depicta.  
*Guald. T. 30. C.*

Ex *Margia*.

## VOLETTES & CYLINDRITES

1. *Voluta*, seu *Cochlea conoides*,  
macronata, insigniter striata, sinus  
costis & latis, mucrono papilloso,  
fatis, unci fasciis albis colore sub-  
rubro



*Pelemmiana.*

79

rubro uadaria variegata circumdata. *Gast. Tab. 10. A.*

*Ex Scisly & Augusti-Taurinorum.*

2. *Cochlea concidea*, macronata, lavis, albedo, apice aliquantulum flava. *Gast. Tab. 10. B.*

*Ex Marzara.*

3. *Cochlea concidea*, subfusca, linctis ex rubro obscuro alioque interruptis circumdata, & punctata. *Gast. Ind. Tab. 10. H.*

*Ex Tigliole.*

4. *Cochlea longa*, pyriformis, vulgata, lavis strata, ex albedo purpurea. *Gast. Tab. 11. G.*

*Ex valle d' Andora.*

5. *Cochlea cylindroides*, lavis, vel subcava, vel leucophas, vel albedo, maculis subpurgatis distincta. *Gast. Ind. Tab. 11. C. D. E.*

*Ex Scisly & Augusti-Taurinorum.*

6. *Cochlea longa*, pyriformis, vulgata, cinerea, albedi fuscis distincta. *Gast. Tab. 11. C.*

*Ex istem locis.*

7. *Cochlea cylindroides*, oris labio

74. *Crydographia*

interno in lumine fimbriâ obscurâ fimbriâ distincto, subalbida, ex fusco notatum lineis, fuscâ latâ prope orbis sulcum notata. *Gualt. Tab. 13. H.*

*Indica.*

8. *Cochlea caracollæ umbonata*, in apice tumida striata, obscurè crocea, ex albidioradum & maculata. *Gualt. Tab. 21. A.*

*Ex Japone, spissis per singulas.*

9. *Cochlea concidea*, basi planâ & insigniter corosâ, candidissima & laevi punctum, maculata & fuscata, laevi inconvexa pulvis signatissimas circumscriptis, rostro obscurâ & violacea. *Gualt. Tab. 22. A.*

*Ex rivulis Tauricenis & Japone; sed etiam hujus juncus exemplum colligitur.*

10. *Cochlea concidea*, umbone sine compluvio, apice umbonem striata, nigra, ponderosa, subalbida, notata hâtracis vel rula per laticem dispositis circumscriptis. *Gualt. Tab. 21. B.*

*Ex Japone.*

*Pedemontana.* 71

11. *Cochlea concoides*, umbonata, umbone papilloso, apice luteo, costis, magnis maculis luteis nebulatis. *Gmel. Tab. 20. G.*

Ex *Scalpe*, *Darona*, *Maraspara* & *vallis d'Andora*; sed parca.

12. *Cochlea concoides*, umbonata, colore murelino depicta, striis lineis integris, velut serice subulino filo, undique cincta & fasciata. *Gmel. Tab. 20. G.*

Ex *Scalpe*.

GLOBOSITA.

*Globosifera* exemplaria aliquando repert in vicinis *Auguste-Taurinorum*, ad radices collis eujassam ad latus montis PP. Capucinorum in, qui locus est perfructus plenissimus. Hos autem *Globositas* cum marini respondantibus referre impossibile est, cochleas plurimas innuunt.

PORCELLANITE.

Mirum frequenter sunt *Porcellanite*. *Diversorum Porcellanitarum*  
Fij

Fragmenta adinventum in collibus quibusdam de *Savoye*. Unum Porcellaneum collecti in valle d'*Andane*, qui est Porcellana *Afficher* dicta. Copiosi sunt Porcellaneos in colle memorato *Taurinensi*, eorum substantiis in *Scientiam* versi. In multisque figuris de magnitudine videntur, sed cum in hoc genere *Conchili* color de varia colorum compositione species definiant, qui nullas amplius superest in his Porcellanis, paucas omnino liquet species enumerare, cui nimirum, quae forma petitis distinguit. Sequentes igitur enumeramus.

1. Porcellana *Afficher* dicta. *D'Argenville*, *Conch. Tab. 22. E. F.*

Ex valle d'*Andane* & *Auguste-Taurinorum*.

2. Porcellana *Talpa*. *D'Argenville*, *Conch. Tab. 22. H.*

Ex vicinis *Auguste-Taurinorum*.

3. Porcellana *Achaia* virgata. *D'Argenville*, *Conch. Tab. 22. I.*

*Idem.*

OPERCULITES.

Operculitis inter marina fossilia  
raro occurritis exemplaria aliquibus  
locis, sed parca colliguntur in colle  
quodam Taurinensi, in collibus di  
Sciòpe, Maranense, la Piovra, &c.  
Democritus collis copiosis, quin  
crem, Operculitis exhibent. Reperit  
vix sunt sequentes species.

1. Operculum rubescens, subrotun-  
dum, in se concavum, subulidum,  
aliquando ex candido rubrum, al-  
quando flavum, Umbilicus cen-  
tralis, latus S. Margaritæ, acutus  
S. Latus distans. Gualt. Ind. Tab.  
30. C. F.

Quod lateri C exhibetur à  
Gualtierio, majus est, & hujus-  
modi similitudinis Operculitis in  
vasis d' Adamæ collegi. Lateri verò  
F representatur duplo minores  
Operculitis, ad maris litora frequen-  
tissimi, & apud nos reperendi in  
collibus dictis Taurinensibus, di Sciò-  
pe, Maranense, Tigbiole, la Pio-  
F u]

pan, di-vies del Mandovi, & abun-  
dant in collibus Denonryibus.

2. Operculum testaceum, ex una parte  
rectum, ex altera subrotundum,  
marginibus striatum, ditis à sum-  
mis ad peripheriam incurvati-  
bus, foveola marginatam. Gaster.  
*Ind. Tab. 79. P.*

Ex Masagana mihi pervenit op-  
timè servata & integerrima hac  
Operculum.

3. Operculum tenuissimum quidam  
Taurinense. Hujus similem apud  
Auctores nondum offendi. Magna  
copiam ejus est in colle novo Tauri-  
nensi, & diversis amplitudinibus ibi  
adhaerentibus, majoribus copiam  
equantibus, minus via hinc.  
Fragiles sunt hæ Operculum, & te-  
nuissima, formâ ellipticâ, quæ ex  
una parte rectâ transversè truncata  
est.

## ICHTHYOFAUNA

Desegere nondum sicut piscium  
impositiones, quales erant in mon-  
tibus Glaronensibus, Olingensibus,

Pappenheimeribus, Illebiarib, Voren-  
 zibus, &c. dentes piscium, vulgè  
 Glossopetra dicti, solummodo usque  
 nunc occurrerunt; neque enim fre-  
 quenter sunt. Loci quo Glossopetra  
 prevalerunt, sunt colles di *Montello*,  
 di *vino del Mondovi* & *Darmasfer*  
 colles, qui uberè magis Glossope-  
 trae continent, usque Molitoribus  
 similes. Multiplicis generis adfunt,  
 cuspidati acutissimi, tubulati, trian-  
 gulares, ovi levi aut serrati, &c. co-  
 muni.

## ZOOLOGIA.

Nunc aliis superius quadripe-  
 dum potissimum recensenda. Zoologi-  
 pum quadrupedia exemplar apud  
 nos reperitur est omnino insignis, ele-  
 phantis solites, ut puto, solent. Ha-  
 jecti videri novum debet amico meo  
 clarissimo Vincenzo Veyura, Medi-  
 co Atrani, qui Conchiliorum insigni  
 collectione in vicinia *Astorian* sedis,  
 Mulicolum meum plurimè dicit. Il-  
 lus enim ad aures eius hujus re-  
 perti notitia pervenisse, per litteras

statim me fecit participem. Videram  
non habeo, inquit, quo tibi signifi-  
cem famulum dolorem, quem unius  
artibus hoc tantum acceptus natus i  
in vincti scilicet quidam loci Sany  
(1) superoribus ante eam sedentem.  
Pant fortis possidet in magni quo-  
drupedi statum incidisse, cuius co-  
por habundam magnitudinem longi supe-  
ratur, & dantur longis cornibus ar-  
matur; dentes erant amplissimi,  
qui statim universi magnitudinem res-  
pondebant. Unus ex minoribus por-  
tus explorans, repertum est ponder-  
are libras duodecim; cisternam ampli-  
tudo erat maxima. Deinde iterum fam-  
ulorum, cum crinibus huius perspicui  
ne cisternam singularem superesset, quod  
illi commanitionem, cum parum a rasti-  
cis fuerit dispersum, parum ab intro-  
itu Bergomae quidem transvolutum. Por-  
tus deinde unam in Magni Ducis  
Ecclesia Massimam transiisse; cisternam  
interius se facio, cisternam unam (neque  
ex maioribus est) missam fuisse ad

(1) Sany est oppidum parva distantia ab urbe  
à hanc cisternam.



*Pedemonense.*

81

praclarum cum Praeceptorem nostrum  
*Johannem Baptistam Bianchi.*

Costa haec inter cetera Musae sui  
etiam nunc aservatur ab hoc prae-  
viro nostro olim dilectissimo Praecep-  
tore, nunc Magistrato Medicorum  
Tugrisensium Principe. Longitudo  
hujus costae est pedum trium Parise-  
nsium, cum pollice uno; altitudo in  
superiori parte est pedis unus; crassi-  
tudo unctus unus cum tribus lineis;  
pondus librarum nostrarum undecim.  
Costa haec tamen non est, sed abscissi  
partes abscissae; & quoniam ex epi-  
dem curvaturae conspiciuntur, partes  
deficiente subjectae est.

Licet inquit integrum scelerem non  
videris, ex hac, quae superest, am-  
plissima costâ, denota pondere, co-  
rum amantâ, & scelerum amplitudi-  
ne, mihi conspiciantur licet, elephantis  
scelerum fuisse; & unam tam ex-  
celsam monumentum ita male disper-  
sam non fuisset, monstrarique posset.  
Inter rursusque perniciosa locum suum  
haberet profectû: dentes enim, cor-  
nae, ossa varia, caque dispersa, plu-  
ribus reperta locis sunt, ut in Angliâ,

32 Oryctographia, &c.

Germaniâ, Russiâ, Siberiâ, &c. in proximâ Etruriâ (1); sed integrum elephasus societatem tenuissima omnino res est.

Inter Zoolithos quadrupedis dentium etiam locum suum meretur cornu cervinum in Museo meo assertum, quod repertum est in argilla strato collis cajsaldam di Capagnolo, &c. mihi humanissime datum à doctissimo viro Equite de Robilant, Regi laboratorii Chymici supremo Doctore, & sedivatum coronam Regis nostri generalis inspectore. Neque commemorandum quidam, quem reperi in colle quodam di Sesto cum me conchiliis, quæ cæruleam colorem acquiescent. Dens ille ex flavo cæruleus, &c. similis est denti cædum à Cl. Rozzomario descripto (2), ubi integram Turcosæ Gallicæ Historem exponit. Eum idcirco inter quadrupedum dentes referimus; minimèque dubitamus, verum quam Turcosam continere.

(1) Doctores elephasus scilicet legi merentur Dissertationes Miani in Conspectibus Academicis Regni Persidis anno 1795, & Turcosæ Turcorum Historiam scriptam, Tom. V. p. 112.

(2) Mém. de l'Acad. an. 1793. pag. 176.

## INDEX LOCORUM

*principum, quibus corpora marina  
fossilia colligenda sunt.*

**I**n provinciâ *Taurinensi* : *Angula* Taurinorum proximi colles, *Andriana*, *Avigliano* (1), *Basiglio*, *Casal-Bergono*, *Chieri*, *Cinisa*, *Castello*, *Levensio*, *Mantova*, *Moncalda*, *Marbello*, *Pavese*, *Pino di Chieri*, *Rivale*, *Sestese*, *Vernone*.

In provinciâ *Alta-Pempe* : *Canale*, *Mas-*  
*sa*, *Nove*, *Sommariva del Bosco*, *Sorve-*  
*longa*.

In provinciâ *Astiensi* : *Univaria* pene hinc  
proxima maribus undâ exhibet fossilia *Cen-*  
*ozoica*.

In provinciâ *Monte-Rogato* : *quæ vicinis*,  
*Rogato*, *Montebello*, *Villanova*.

In provinciâ *Maritima* *Montemari* *Nicoletti*  
proximi.

(1) *Authe Dei Tanti dei Perspersione, di Pa-*  
*ria, 1814.* operibus hinc singula, quibus inscrip-  
tionibus corpora marina fossilia, effert adeo in re-  
gionibus in provinciâ *Taurinensi* : *Angula*, *Pavese* &  
*Chieri*, *Casaglio*, *Castello*, *Levensio* &c. in quibus  
pluribus locis, nec in quibus ceteris videtur  
fossilia. Post hanc *Authe* ex loco pariter inscrip-  
tionibus *Avigliano*, operibus fossilibus hinc inscrip-  
tionibus, & corpora fossilia in *Helvetiam* proxima  
inscrip-  
tionibus hinc hinc hinc.

*F I N I S.*

In provinciis Cyprius : Gualtero, Monacho,  
vo, Scrutatore, Vigante.

In provinciis Apud : Alon, Tasso, Ma-  
moniani, Modice, Monarchico, Piana,  
Scarpiglione.

In provinciis Alexandria : Anania.

In provinciis Syria : Daronides colles  
& Chama.

In provinciis Egyptus : In Sanduano, inter  
Alpi Taurinenses.

*F I N I S.*

**LIVRES d'Histoire Naturelle,**  
Médicine, Chirurgie, Physique &  
Astronomie, imprimés, ou qui se  
trouvent en nombre chez le même  
Libraire.

- A** *Annuaire de l'Etat des Evénemens his-*  
*toires, trad. de Luchet par Bodin,*  
*12* 2 l. 10 s.  
 — *de la Médecine pratique, trad. d'Alton,*  
*7. 8. 11.* 17 l. 10 s.  
*Accouchemens de Montaigne, a. n. 4.* 13 l.  
*Adams de Anselmus, grand de laint, a. n.*  
 + 25 l.  
*Agronomie parfaite, trad. d'Agricola, a. n.*  
 2. *fig.* 3 l.  
*Analyse démontrée par le P. Bagnon, a. n.*  
 + *fig.* 21 l.  
*Anaxagore de Paros, trad. d'Heider, a. n.*  
 11. *fig.* 7 l. 10 s.  
 — *par Warton, + fig.* 12 l.  
*Art de conduire la faulx, trad. de Chepus,*  
*avec un abrégé des alimens, 11.* 3 l.  
 — *de cultiver les blans blancs, d'élever*  
*les vers à soie &c de tirer la laine des*  
*laines, 2.* 2 l.  
*Barbier, Hist. Plutarque, 3e. fol. *fig.** 14 l.  
*Bernoulli opus omnia, 1740. a. n. 4.* 25 l.  
 — *opuscula de Leibniz Commentar. Phil.*  
*solita. & Mathematic. 1741. a. n. + 18 l.*

Bibliothèque des Philosophes Chrétiens, 4 n. 12.	12 L
Bernardus Thesaurus Erythraeus, seu prima arsis Erythraea, 4. pp.	13 L
Caméologie ou Traité des charrues, avec le usage de les employer de même. 12. pp.	8 L
Comment. de Michèle sur Docteurale, fol. pp.	12 L
Contes de Chénis, par Lemery, 4.	13 L
——— (sur les Principes de Newton & de Schall, 2 n. 12.)	6 L
Dapperus Philosophus, 4 n. 12.	8 L
Dictionnaire d'Agriculture, Jardinage, etc. 1 n. 4. pp.	10 L
——— Microscopique, par Chénis, 4 n. fol. 42 L	
——— le Supplément Apertement, n. fol.	13 L
——— portrait de Poussin, Sculpture de Gu- sien, 2, 1757. pp.	6 L
——— Philosophique, ou introd. à la con- naissance de l'homme, 2. 17 37. 3 L	
Deux de M. Klein sur le système de M. Lau- rent, 2. bruché.	1 L 10 c.
Encyclopédie Méthodique, par le P. Malle- branche, 4 n. 12.	3 L
——— par le P. Regnaud, 2 n. 12. pp.	2 L 10 c.
——— Physique, par le même, 5 n. 12. 12 L 10 c.	
Essai de Physique, trad. de Maffei, bruché, 1 n. 4. pp.	10 L
——— sur l'Entendement humain, trad. de Locke, 4 n. 12.	10 L
Examen du Pythagorisme, par Goussier, fol.	13 L

- Explication Physique des Sens, des Idées, des  
 mod. de l'Anglais, 4 v. 12. 1733. 5 l.  
 Histoire raisonnée des Chirurges, 2 v. 4. fig. 4 l.  
 Mémoires de la Chirurgie en France, 4. 12. 12.  
 — de la Philosophie Mécanique, 2 v. 12.  
 3 l. 10 l.  
 — des dougnes, par Perret, 2 v. 4. fig. 12 l.  
 — des Plumes, par Buchan, 2 v. 12. fig. 3 l.  
 — Nouvelle du Sédul, par M. Adanson,  
 4. fig.  
 Instructions sur les jardins, par de la Quinte-  
 rin, 2 v. 4. fig. 12 l.  
 Leçons philosoph. sur les Physicomètres, 12.  
 2 l. 10 l.  
 — sur le progrès des Sciences, par M. de  
 Mairan, 12.  
 Méthode (la) de la Chirurgie des poisons,  
 12. 2 l. 10 l.  
 — la même, par Macquet, 4 v. 12. 10 l.  
 Monde (le) enchâssé, trad. de Buchan, 2 v.  
 12. 12 l.  
 Nouveaux Opéra, de Henry Clavel, 4. 10 l.  
 — qu'il est possible, 2 v. 4. 12 l.  
 Œuvres de Louis de Lucie, 4 v. 12. 3 l.  
 — de M. de Mairan, 4 v. 12. 1734. 10 l.  
 Ord. naturel des Œuvres de ces de Poillon,  
 2 v. 12. 12 l.  
 Origines de la Physique, par le P. Regnaud,  
 2 v. 12. 6 l.  
 Pharmacopée de Chaux, 2 v. 4. 12 l.  
 — de Linnæus, avec les notes Françaises,  
 1794. 2. 12 l.  
 — de Quincy, trad. par Chaulin, 4. 12 l.

Reflexions sur la Physique moderne, par M. l'abbé ***.	12.	1717.	1 l.
sur l'immortalité de l'ame, 12.			2 l.
Règles animal, (le) par M. Buffon, Lat.	8.		2 l.
de l'espèce, 8.	1714.		2 l.
Remarques sur la méthode inférieure, par M. Winslow, 12.			1 l. 12.
Règles, sur les notions des notions naturelles de l'âme, 8.	1714.		2 l.
Science du calcul, par le P. Reynaud, 12.			1 l.
Système naturel de règles animal, 12.			2 l.
Tableau de l'Arbre, avec des notes, 12.	1714.		1 l.
Traité des maladies des yeux, par de Salu- tari, 12.			2 l.
sur la nature médicale, par Goddard, 12.	1714.		2 l.
sur la nature médicale, contenant l'histoire des animaux, 12.	1714.		10 l. 10 c.
sur la nature médicale, par M. de la Roche, 12.	1714.		2 l.

